編　　號：601

開脾草

別　　名：馬蘭

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Aster indicus* L

生育特徵：多年生草本，葉互生，葉片倒披針狀橢圓形或倒卵狀橢圓形。葉邊緣粗大鋸齒。頭狀花序，花淡藍紫色，中央管狀花黃色。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：葉含精油 0.1%。

功　　效：採全草，辛苦、瘀血清熱、利濕解毒。治肺結咳、絞腸痧痛、胃潰瘍、咽喉腫痛、乳癰、急性睪丸炎、疔瘡炎腫、小兒疳積疱疹、腮腺炎。

產　　地：中國、台灣、日本。

編　　號：602

決明子

別　　名：草決明、馬蹄決明、假綠豆

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Cassia obtusifolia* L.

生育特徵：一年生草本，羽狀複葉，互生，小葉 3 對，倒卵形或長圓狀倒卵形，先端鈍。花成對腋生，黃色。夾果線形。種子呈馬蹄形。花果期 7-11 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種子。

主要成分：主成分含大黃素(emodin)，大黃酚(chrysophanol)，決明素(obtusin)等。

功　　效：採用種子，性微寒、味甘、苦、為清熱明目、潤腸通便、治目赤澀痛、羞明多淚、頭痛眩暈、目暗不明、大便秘結。

產　　地：中國、台灣、新竹。

編　號：603

朱蕉

別　名：紅竹、鐵樹、朱竹

科　名：百合科(Liliaceae)

學　名：*Cordyline terminalis* kunth var *baptistii* Rehd.

生育特徵：多年生灌木，葉長在不分枝的莖上，葉呈長橢圓形至披針形，葉紅色。花序由白色，淺紫色或紅色花，漿果紅色。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：葉、根莖。

主要成分：生物鹼。

功　效：觀賞。幼葉可食，增加米飯味，烤魚包裹葉。根可食用，發酵成飲料。根狀莖可治腹瀉。葉治咳嗽。

產　地：台灣、新竹。

編　號：604

濱防風

別　名：防葵、防風、牡丹防風、房宛

科　名：繖形科(Umbelliferae)

學　名：*Peucedanum japonicum* Thunb.

生育特徵：多年生草本植物，根肥厚，分枝，根生葉，多數，莖生葉少數，1-3 回三出複葉，小葉倒卵狀契形，複繖形花序，花白色，果長橢圓狀卵形，被細毛長4-6mm，寬 2-6mm.夏開花。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　效：採根治感冒、咳嗽、痛風、膀胱及腸疾。嫩莖葉供食用。

產　地：台灣北部濱海岸及中國、日本、琉球、菲律賓等地。

編　號：605

紅刺蔥

別　名：食茱萸、刺江某、茱萸
科　名：芸香科(Rutaceae)
學　名：*Zanthoxylum ailanthoides* Siebold et Zuccarini
生育特徵：多年生落葉性喬木，樹幹具乳房狀銳刺，幼枝及葉脈皆具銳刺，大型羽狀複葉，卵長橢圓形或長橢圓狀披針形，邊緣淺圓鋸齒，花單性，繖房狀圓錐花序，頂生枝端。花小，多枚，淺綠色或淡白黃色，蓇葖果近球形，熟紅。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。
利用部位：根、樹皮及果實
主要成分：根含白鮮鹼(dictamnine)花椒樹皮素甲(xanthy letin)樟葉木防己鹼(laurifoline)等，樹皮含木防己鹼(trilobine)等。葉含精油、樹脂及酚類，果實含異茴芹素(iso-pinpine llin)等。
功　效：根有祛風通經、活血散瘀、消腫、解蛇毒、治感冒、心腹冷痛、風濕關節痛、筋骨酸痛、跌打腫痛。樹皮祛風濕、通經絡、殺蟲、解毒。葉外用治毒蛇傷、外傷出血、腫痛。果實，小毒。溫中、燥濕、健胃助消化、止痛、殺蟲。
產　地：中國及日本、台灣山野地區亦有分布。

編　號：606

樟樹

別　名：香樟木
科　名：樟科(Lauraceae)
學　名：*Cinnamomum camphorac*(L.)Sieb.
英　名：Camphor tree
生育特徵：年生常綠喬木，葉互生，革質，卵狀橢圓形及卵形，全緣或呈波狀。圓錐花序，腋生，花小，綠白色或淡黃色。核果球形，熟時紫黑色。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。
利用部位：多採根莖樹皮、葉、樟腦供藥用。
主要成分：根、莖、葉含樟腦(camphor)及樟腦油，α-樟腦二萜(camphorene)，莖含樟油 0.5-3%，主成分 cineol 5-6%，葉含樟油 0.5-1%，主成分 safral10%。
功　效：性辛溫，無毒，祛風濕、行氣血、利關節。根為祛風止痛。主治腹痛、急性胃腸炎、皮膚病、行氣強心藥。莖治心腹痛、霍亂、腹脹、中樞神經興奮、局部刺激。葉治跌打傷瘀痛、止血行氣、亦治腹痛、痢疾、皮膚病。樟腦為強心及防蟲、通關竅、利滯氣、疥癬風瘙、殺蟲。
產　地：台灣山野、中國各地。

蒲桃

編　　號：607

科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)

學　　名：*Syzygium jambos*(L.)Alston

生育特徵：多年生常綠小喬木，葉子有香味，成熟果實呈粉紅黃色，可食用，具玫瑰香味的果實用於甜食和香料。花白色有香味。葉長橢圓狀披針形或長披針形。花聚繖花序，花小，芳香，黃綠色。果肉白色，內種子 1-3 粒，種子球形。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。

利用部位：樹皮、種子。

主要成分：主成分樹皮含鞣質 7%，蒲桃鹼(jambosine)，根皮含蒲桃鹼。果實含粗蛋白、有幾酸、葡萄糖等。根、莖、葉含氫氰酸。

功　　效：樹皮和種子可治療糖尿病和腹瀉、創傷出血、痢疾。葉有清涼退火之效。

產　　地：印尼、現台灣亦有分布。

甜黃皮

編　　號：608

別　　名：黃皮樹、黃柏
小黃連樹。

科　　名：芸香科(Rutaceae)

學　　名：*Phellodendron chinense* Schneid

生育特徵：小喬木，樹皮淡黃褐色或淡灰色，葉對生，羽狀複葉，小葉 5-13，卵形或卵狀披針形，邊緣細鋸齒，圓錐花序，頂生，雌雄異株，花小多，黃綠色，漿果核果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：樹皮含小蘗鹼 4-55%。

功　　效：性寒、味苦、果甜、清熱燥濕、瀉火除蒸、解毒療瘡、溼熱瀉痢、黃疸、帶下熱淋、腳氣、骨蒸勞熱、盜汗、遺精、瘡瘍、腫毒。

產　　地：中國、台灣、新竹。

編　號：609

酸黃皮

別　　名：黃皮樹、黃柏、小黃連樹

科　　名：芸香科(Rutaceae)

學　　名：*Phellodendron chinense* Schneid

生育特徵：小喬木，樹皮淡黃褐色或淡灰色，葉對生，羽狀複葉，小葉5-13，卵形或卵狀披針形邊緣細鋸齒。圓錐花序頂生，雌雄異株，花小多，黃綠色，漿果核果球形，紫黑色，有香氣，花果期5-10月。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：樹皮含小蘗鹼 4-55%。

功　　效：性味寒、苦、果酸。熱燥濕、瀉火除蒸、解毒療瘡、溼熱瀉痢、黃疸、帶下熱淋、腳氣、骨蒸勞熱、盜汗、遺精、瘡瘍、腫毒。

產　　地：中國、台灣、新竹。

編　號：610

董寶蓮

別　　名：肯氏蒲桃

科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)

學　　名：*Eugenia cumini* Druce

英　　名：Jambolan.Jambolan plum

生育特徵：為多年生常綠中喬木，葉淡紫色，革質，卵狀長橢圓形、長橢圓狀披針形或倒卵狀長橢圓形，全緣，白色或帶紫色。漿果，球形或短橢圓形，果肉紫紅色。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：種子含樹脂（jambulol），樹皮含鞣質19%，葉含鞣質 12-13%，果含鈣、鐵較多。

功　　效：種子治糖尿病、腹瀉、痢疾。果實作醋、釀酒。樹皮為收斂劑、治皮膚病腹瀉。葉為痢痰之收斂劑，果為胆汁腹瀉之收斂劑。治喉痛、癬、健胃、驅風、利尿、糖尿病等特效藥。

產　　地：印度、馬來西亞、錫蘭、中國福建、廣東、海南島、廣西、爪哇、菲律賓、澳洲北部等地，台灣已引進種植。

編　號：611

山陀兒

科　名：楝科(Meliaceae)

學　名：*Sandoricum indicum* Cav

英　名：Sandol. Sentoel. Setol

生育特徵：年生常綠喬木，樹皮灰褐色，小枝嫩葉帶淺亦褐色，被淡黃色毛，葉三出複葉，互生，長 22-55cm，小葉卵狀橢圓形至廣橢圓形，全緣，長 10-35cm，寬 6-18cm，3-5 月開花，花淡黃白色，果實扁球形，7-9 月成熟，黃色或橙黃色。種子褐色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、樹皮。

主要成分：樹皮及果皮含微量生物鹼，稱山陀兒酸(Sandoric acid)果實含有維生素 B 及 G，礦物質及蛋白質、脂肪等。

功　效：取根為驅風藥，治腹瀉及痢疾，並強壯。樹皮為婦女產後保養藥。

產　地：印度、馬來半島、台灣嘉義地區有栽培。

編　號：612

蛋黃果

別　名：仙桃

科　名：山欖科(Sapotaceae)

學　名：*Lucuma nervosa*

英　名：Egg-fruit,Canistel

生育特徵：多年生常綠或偶而落葉喬木，葉互生，長披針形或披針形，全緣，葉尖銳。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：生物鹼、維生素。

功　效：果成熟時呈蛋黃色，可食，為保健食品用。

產　地：台灣、新竹。

編　號：613

番龍眼

科　名：無患子科
(Sapindaceae)
學　名：*Pometia pinnata* Forest
生育特徵：多年生喬木，葉互生，羽狀複葉，小葉卵狀披針形。花穗狀花序，開白色花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、樹皮。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根驅蟲。樹皮止瀉、退癀、生肌。治腹痛、腹瀉、黃疸。
產　地：嘉義地區栽培。



編　號：614

人心果

別　名：吳鳳柿
科　名：山欖科(Sapotaceae)
學　名：*Achras zapota* L.
生育特徵：多年生喬木，全株具乳汁，葉叢生枝端，螺旋狀著生，葉片長橢圓形、倒卵狀長橢圓形。花腋生，白色，核果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果皮、根。
主要成分：維生素、樹脂。
功　效：果供食用。果皮收斂、解熱、強壯、治扁桃腺炎、急性胃腸炎。幹採樹脂，供製口香糖。
產　地：南美、台灣嘉義亦栽培。

酸楊桃

編　號：615
別　名：木胡瓜、三稔
長葉楊桃、胡瓜樹
科　名：酢醬草科(Oxalidaceae)
學　名：*Averrhoa bilimbi*
英　名：Star Fruit
生育特徵：多年生喬木，株高 14m，光亮的複葉，排列成螺旋狀，對生常綠小葉。花淺紅褐色無香味。
繁殖方法：實生法繁殖、嫁接法繁殖。
利用部位：果實、葉子。
主要成分：果含維生素 B1、B2、草酸氫鉀。樹皮含鞣質。
功　效：酸味金色果實，具香郁般的香味，為絕佳的解渴飲料，做泡菜、果醬。因酸味故常沾鹽生吃，加入沙拉中或做蜜餞。改善糖尿病、治高血壓、齟炎、座瘡、咳嗽。葉子可治風濕病。
產　地：印度、台灣亦栽培。

華西肉桂

編　號：616
別　名：川桂、桂皮、官桂
紫桂、大葉香葉子樹
三條筋
科　名：樟科(Lauraceae)
學　名：*Cinnamomum wilsonii* Gamble
生育特徵：多年生喬木，枝葉光滑，葉對生，葉形小，為卵形、長橢圓狀卵形。花黃褐色，果橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。
利用部位：桂皮。
主要成分：精油。
功　效：採收桂皮。小枝及皮味香辣，作香料、補劑、興奮劑。
產　地：廣東、雲南、四川、湖北、台灣。

蘭嶼肉桂

編　號：617

科　名：樟科(Lauraceae)

學　名：*Cinnamomum kotoense* Kanelira&Sasaki

生育特徵：多年生喬木，枝光滑，葉對生或近對生，卵形或長橢圓狀卵形，葉尖鈍。花絮圓錐狀，黃褐色，花披外表被絨毛。果橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：桂皮。

主要成分：精油。

功　效：採桂皮，小枝及皮做香料補劑。興奮劑。並為芳香健胃劑。

產　地：蘭嶼、新竹。

黃梔子

編　號：618

別　名：梔、山梔、黃枝、山枝子

科　名：茜草科(Rubiaceae)

學　名：*Gardenia jasminoides* Ellis

英　名：Cape Jasmine Fruit

生育特徵：多年生長綠灌木，葉對生或三葉輪生，葉片革質，長橢圓形或倒卵狀披針形，全緣。花單生，白色。果實橢圓形或長卵圓形。熟時紅黃色或棕紅色。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：果實、葉、根及幹。

主要成分：多含梔子苷(geniposide)山梔苷黃色素等。

功　效：1.梔子味苦性寒，為有名消炎解熱藥，治急性胆道炎(黃疸)胃及食道炎、下部出血炎症(血尿、淋病)外用消炎退腫、治跌打。果實炒後稱黑山梔，止血、煩嘔、解瘀、表熱，又能洩心肺之邪熱，清三焦之鬱火。2.根及幹為消炎、解熱、治牙痛。3.葉治跌打、消腫

產　地：中國華中南、台灣、日本。

編　　號：619

榆樹

別　　名：榆、家榆、白榆
鐵榆、欑天榆
鐵樹、零榆。

科　　名：榆科(Ulmaceae)

學　　名：*Ulmus pumila* L.

生育特徵：多年生落葉喬木。葉為互生，有鋸齒，雄蕊花紅色，扁平翅果。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。

利用部位：葉、樹皮。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採樹皮為利尿劑。葉、花及莢仁均入藥。葉為痔瘡藥，皮膚發炎。枝葉液可作洗濯液治療禿頭。其內樹皮具黏稠而芳香，可作復健飲料並作輕瀉劑，亦為消炎劑。

產　　地：中國、台灣亦植。

編　　號：620

巴豆

別　　名：廣仔、猛樹
貢仔、廣仔子

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Croton tiglium* L.

生育特徵：多年生灌木植物或常綠小喬木，葉互生，嫩葉及葉背有毛，葉卵形，葉尖，細鋸齒緣。夏開花，花單性，總狀花序。花帶綠白色，蒴果橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根莖及果子。

主要成分：巴豆含巴豆油(Oleumtiglii)30~45%，蛋白質 18%，根含單寧 65%。

功　　效：秋冬採果。種子為猛瀉劑，煎服治腹痛，毒魚，蛇傷。根及枝幹全年採根稱落水金光，治腹痛、蛇傷。

產　　地：中國、台灣。

編　　號：621

孔雀合歡

別　　名：孔雀豆、紅豆、海紅豆

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Adenanthera paronina* L.

生育特徵：多年生灌木至小喬木。葉對生，二回奇樹羽狀複葉，柄紫色，小葉長方形或橢圓狀長方形，對生，先端圓，總狀花序，腋生，春夏開黃花，有芳香，莢果線形，種子鮮紅色，圓形，極美觀。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉、種子。

主要成分：種子含脂肪油25%，蛋白質39%，皮含皂素。樹幹流出樹酯。

功　　效：採種子末外用，瘡癤化膿、治頭痛。葉煎服，治痛風、尿道出血。

產　　地：台灣亦植。

編　　號：622

台灣黃柏

別　　名：台灣黃蘗、魏氏黃柏
黃柏

科　　名：芸香科(Rutaceae)

學　　名：*Phellodendron wilsonii* Hay.et.Kanch.

生育特徵：多年生長落葉喬木，內皮鮮黃色。奇數羽狀複葉，小葉互生或對生，長卵形，長8cm，寬3cm，全緣或波狀緣。花為雜性花，腋生或頂生，夏開，聚繖花序，果球形。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。

利用部位：樹皮。

主要成分：小蘗鹼。

功　　效：採樹皮為苦味健胃劑，治腹痛、消化不良、細菌性腸炎、痢疾、結核性腹瀉等、洗眼劑。黃疸、肝病、遺精、癌傷腫毒。

產　　地：台灣。

編　號：623

橳樹（東沙十號）

別　名：水冬瓜、海巴戟天等

科　名：茜草科(Rubiaceae)

學　名：*Morinda citrifolia* L..

生育特徵：多年生灌木至小喬木，葉對生，長橢圓形，廣披針形。花白色，聚合果。

繁殖方法：實生法繁殖和扦插繁殖。

利用部位：根、葉。

主要成分：丹寧卡、賽洛寧。

功　效：促進新陳代謝，活化細胞。

產　地：東沙群島、島內亦植。

編　號：624

大仙楂

別　名：紅果、棠棣、綠梨北山楂、山楂

科　名：薔薇科(Rosaceae)

學　名：*Crataegus pinnatifida* Bge var.*major* N.E.Br

英　名：Hawthorn Fruit

生育特徵：多年生落葉喬木，葉互生，寬卵形或三角狀卵形，基部截形或寬楔形。花為複繖房花序，白色，梨果深紅色，近球形。

繁殖方法：實生法繁殖或接穗繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：含金絲桃苷(hyperin)山楂酸(crataegolic acid)等。

功　效：消食健胃、行氣散瘀、用於肉食積滯、胃烷脹滿、瀉痢腹痛、瘀血經閉、產後瘀阻、心腹刺痛、疝氣疼痛、高血脂症。

產　地：中國、台灣亦植。

編　號：625

小仙楂

別　名：野山楂、南山楂
山查、澀梨、山仙查

科　名：薔薇科(Rosaceae)

學　名：*Crataegus cuneata* Sieb.et Zucc

英　名：Hawthorn Frait

生育特徵：多年生落葉喬木，餘同大仙楂。果較小，圓球形，表面灰紅色，有細紋及小斑點，果肉薄。味酸微澀。藥效及繁殖同大仙楂。

繁殖方法：實生法繁殖或接穗繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：含金絲桃苷、山楂酸。

功　效：果較小，肉薄。消食健胃、行氣散瘀、心腹刺痛、疝氣疼痛、高脂血症。

產　地：中國、台灣亦植。

編　號：626

牛心柿

別　名：牛心梨

科　名：番荔枝科(Annonaceae)

學　名：*Annona reticulata* L.

生育特徵：多年生落葉喬木，葉互生，橢圓形至倒卵形，全緣，上面深綠色，背面淡綠色。花雜性，雄花成聚繖花序，雌花單生葉腋，黃白色。漿果，卵圓球形，橙黃色或鮮黃色，夏開花秋收果。

繁殖方法：實生法繁殖或接穗繁殖。

利用部位：根、樹皮、種子及柿葉、柿蒂。

主要成分：柿蒂含羥基三萜酸、葡萄糖、果糖。

功　效：樹皮為強壯劑，根治熱病、牙痛。種子治腹瀉、痢疾。柿葉治血小板減少。柿蒂治呃逆、百日咳、血痳。

產　地：熱帶美洲、台灣亦植。

編　號：627

山馬茶

科　名：夾竹桃科(Apocynaceae)

學　名：*Tabernaemontana divaricata* L.R.Br ex Roem.

生育特徵：為多年生灌木植物。葉對生或輪生，長橢圓形、長橢圓狀卵形至倒披針形，先端漸尖形，全緣或微波緣。聚繖花序，花白色。蓇葖果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、莖、花、葉。

主要成分：全年採根、葉、花、莖全株含山馬茶鹼(tabemaemontanin)等多種生物鹼成分。

功　效：具有擴張血管、強心、抗菌、抗癌等作用。山馬茶定(coronaridin)，有很強之雌激素作用，能阻止受孕。亦為鎮靜、鎮痙之作用。根莖有清熱、解毒、利水、消腫、止痛、頭痛、降血壓、抗癌之效。葉、花治乳腺炎、高血壓、瘡癤、瘋狗咬傷、甲狀腺腫。

產　地：印度、緬甸、台灣亦植。

編　號：628

菌桂

別　名：肉桂、玉桂、牡桂、筒桂

科　名：樟科(Lauraceae)

學　名：*Cinnamomum cassia* Presl.

英　名：Cassia Bark.

生育特徵：為多年生常綠喬木，芳香。葉互生或近對生，長橢圓形至近披針形。花圓錐花序腋生，白色。漿果紫黑色，橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：嫩枝、種子。

主要成分：採皮製揮發油，油中含桂皮醛(cinnamaldehyde)等。

功　效：味辛、甘。補火助陽、引火歸源、散寒止痛、活血通經、為治陽萎、宮冷、心腹冷痛、虛寒吐瀉、經閉、痛經。

產　地：中國雲南、廣西、廣東、福建、台灣亦植。

編　　號：629

山柹

別　　名：山紅柹
科　　名：柹科(Ebenaceae)
學　　名：*Diospyros morrisiana* Hance
生育特徵：多年生落葉喬木，葉互生。卵形至卵狀長橢圓形，先端銳尖至鈍，全緣。花聚繖花序，肉質漿果，球形。
繁殖方法：實生法繁殖及接穗繁殖。
利用部位：果實、柹蒂。
主要成分：根含（isodiospyrin）
功　　效：果實治癩、高血壓、痢疾。果消疾開胃。柹蒂治呃逆及尿崩症。
產　　地：台灣、日本、新竹。



編　　號：630

石柹

別　　名：台灣柹、台東柹
科　　名：柹科(Ebenaceae)
學　　名：*Diospyros oldhami* Maxim. var. *chartacea* Hay.
生育特徵：多年生落葉喬木，葉互生，葉片橢圓形。花腋生，開白花，結核果，果可食。
繁殖方法：實生法繁殖及接穗繁殖。
利用部位：果實。
主要成分：生物鹼。
功　　效：治高血壓及痢疾。
產　　地：台灣。

編　號：631

紅肉李

別　　名：黑刺李
科　　名：薔薇科(Rosaceae)
學　　名：*Prunus spinosa*
生育特徵：多年生小喬木，株高4m，葉互生，深色具刺的枝上長有小型帶鉅齒的卵形葉，開白花。
繁殖方法：實生法繁殖及接穗繁殖。
利用部位：葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：具收斂性的黑色果實可做黑刺李琴酒，亦稱李酒。果實可生吃，木材製球棒，葉為漱口藥。
產　　地：中國、歐洲等、台灣亦植。

編　號：632

桃接李

別　　名：接李
科　　名：薔薇科(Rosaceae)
學　　名：*Prunus domestica* Subsp.institia
生育特徵：多年生小喬木，株高7m，無光澤的綠葉，開白花，葉具鈍齒。
繁殖方法：實生法繁殖及接穗繁殖。
利用部位：根、枝皮。
主要成分：生物鹼。
功　　效：收斂性的根和枝皮，用於治療出血和發燒。
產　　地：中國、歐洲、台灣亦植。

黑松

編　　號：633

別　　名：日本黑松

科　　名：松科(Pinaceae)

學　　名：*Pinus thunbergii Parl*

生育特徵：多年生喬木，多芽銀白色，針葉粗硬2針1束，樹脂管6-11個，中生，種鱗的鱗盾隆起，鱗臍具短刺。球果圓錐狀卵形或卵圓形，長 4-6cm，短柄，熟時褐色。種子倒卵狀橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：花粉、種子。

主要成分：含精油。

功　　效：採製松節油，松根油，透明松香等供藥用。具祛風、止痛、活血消腫、明目。花粉治濕熱。種子可榨油，又可製松針露。

產　　地：日本、中國及台灣等地。

檸檬桉

編　　號：634

別　　名：油桉樹、檸檬香桉樹

科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)

學　　名：*Eucalyptus maculata* Hook. var. *citriodora*(Hook.) F.Muell.

生育特徵：為多年生喬木植物，樹皮灰褐色，老幹每年脫皮，脫皮後表面光滑呈白色葉有柄，互生，褐綠色，披針形，揉捻有濃厚檸蒙香味，蒴果球狀。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：樹皮、葉。

主要成分：鮮葉含精油0.586％乾葉含3-4％，主成分為 citronellal 95-98％。

功　　效：藥效－樹皮及葉，蒸餾精油，作殺蟲劑。葉之精油為製香水之原料。

產　　地：澳洲、台灣亦栽植。

編　　號：635

杜仲

別　　名：木棉、玉絲皮、亂根絲
　　　　　鬼仙木、思仲、思仙
　　　　　扯絲皮、絲棉皮

科　　名：杜仲科(Eucommiaceae)

學　　名：*Eucommia ulmoides* Oliv

英　　名：Eucommia Bark

生育特徵：為多年生落葉喬木，樹皮、葉、果折斷後有銀白色細絲。葉互生，橢圓形或卵狀橢圓形。花單性，異株，無花被，先葉開放，單生於新枝基部。翅果扁薄，狹橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖及插枝繁殖。

利用部位：樹皮。

主要成分：4-6 月剝樹皮，含杜仲胺，杜仲苷(olivil)京尼平(genipin)有機酸、維生素 C 及微量生物鹼。

功　　效：含性溫，味甘，無毒。補肝腎、強筋骨、安胎、高血壓等。其含杜仲酊治高血壓。

產　　地：中國、台灣亦植。

編　　號：636

春不老

別　　名：蘭嶼紫金牛、山豬肉

科　　名：紫金牛科(Myrsinaceae)

學　　名：*Ardisia elliptica* Thunberg.

生育特徵：多年生常綠灌木，多分枝，幼枝及葉柄皆呈紫紅色或暗紅色。葉互生，倒卵形或倒披針狀長橢圓形，全緣。類繖房花序，腋生，花桃紅色至紫紅色。果實為核果，球形，熟紅後變為紫黑色。種子球形，花果期 5-11 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、莖及葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根、莖有清熱、解毒、消腫收斂之效。治肺炎、支氣管痰咳、咽喉腫痛、久年傷、跌打損傷。枝葉有收斂、止瀉之效。治出血、下痢。

產　　地：馬來西亞、菲律賓、硫球、台灣蘭嶼、綠島。

猩猩木

編　　號：637

別　　名：一點紅、聖誕紅

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Euphorbia pulcherrima* Willd

英　　名：Christmas Flower.

生育特徵：為常綠灌木，苞片鮮紅色極為美觀，株高 2-4m，直立，葉橢圓形或廣披針形，花序頂生，花叢生，紅色。乳液有毒。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：枝、葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：枝及葉治慢性內臟病。

產　　地：中國、台灣。

烏心石

編　　號：638

科　　名：木蘭科(Magnoliaceae)

學　　名：*Michelia compressa* (Maxin) Sargent

生育特徵：為多年生喬木，樹幹直，株高 30m，葉長橢圓狀倒披針形，樹幹直。花單生，白色，腋生，蓇葖果內紅色種子。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：心材。

主要成分：含烏心石素（ushinshunine）

功　　效：心材有抗菌作用。

產　　地：日本、琉球、台灣。



編　號：639

台灣風鈴木

別　名：台灣鈴木、台灣柃木
　　　　柃木

科　名：山茶科(Theaceae)

學　名：*Eurya hayatae* Yamamoto

生育特徵：多年生小喬木或灌木，多數枝條，小枝細長，光滑無毛，葉橢圓形或倒卵狀長橢圓形，細小，花單生或叢生，下垂小。雄蕊 19-22 枚，側脈於葉表面不凹陷的。果實為漿果，不開裂，形小有角，多胚乳油質。花淡黃綠色。



繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：樹皮、葉及果實。

主要成分：生物鹼。

功　效：樹皮、葉及果實為治皮膚膿皰。漿果作染料。

產　地：玉山山腹森林、霧社。

編　號：640

大葉合歡

別　名：潤莢合歡、緬甸合歡

科　名：豆科(Leguminosae

學　名：*Albizzia lebbek*(L.)Benth.

英　名：Siris koko.East Indian Walnut

生育特徵：多年生大喬木，葉為羽狀複葉，羽片4-10對，小葉5-8對，為不系邊之橢圓形。花淡綠黃色，腋生，頭狀花，銀白色，有芳香。莢果扁平，熟時淡黃色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：樹皮、種子及花、葉。

主要成分：種子含油率 5.47%，樹皮含單寧 14.16%，含皂素少量。

功　效：其藥效治眼炎、瘰癧性腺腫大。提油治痲瘋。樹皮治眼受傷。根皮治牙床潰瘍，有固齒之效。樹皮及種子具收斂性，治痔瘡、腹瀉。花為清涼藥，外用治癤、疹及腫毒。葉治眼炎。

產　地：印度、緬甸、菲律賓及熱帶非洲、中國及台灣亦植。

編　號：641

銀杏

別　名：白果、公孫樹、鴨掌樹
鴨腳子、佛指甲、佛指柑、靈眼。
科　名：銀杏科(公孫樹科)Ginkgoaceae
學　名：*Ginkgo biloba* L.英名：Maiden Hair-tree
生育特徵：多年生落葉喬木，樹幹直立，葉在短枝上簇生，在長枝上互生。葉片扇形，先端中間二淺裂，基部契形，葉脈平行。花單性，雌雄異株，淡青色。結實如杏桃，生青，熟淡黃色。種子核果狀。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：果實、種子及葉。
主要成分：果實含蛋白質、脂肪、澱粉、灰分、糖、蟻酸、丙酸、丁酸、己酸、纈草酸、球蛋白、蛋白素、養蛋白、小麥蛋白、失水戊糖、天冬素、麥胚醇、植物固醇、組織氨基酸、銀杏酸(Ginkgolic acid)、白果酸(Bilobol)、白果醇(Ginnol)及銀杏酚(Ginkgol)等。果皮含銀杏酸、雙葉醇及白果醇。葉含白果醇、麥胚醇及 Shikiminic 酸。
功　效：採取熟果實，浸水使外皮腐爛，去外種皮，曬乾即白果，味甘，苦澀平。有毒不可多食，斂肺氣、定喘嗽、止帶濁、縮小便。
產　地：中國、日本、台灣。

編　號：642

牛樟

別　名：牛樟、冇樟
科　名：樟科(Lauraceae)
學　名：*Cinnamomum micranthum* Hay.
英　名：Stout campher tree
生育特徵：為多年生常綠喬木，葉革質，卵形或長橢圓形，葉背有白粉。花頂生，短聚繖花序核果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：葉及樹皮、根。
主要成分：其材部含牛樟油，主成分黃樟腦 safrol。
功　效：為製樟油及樟腦供葯用。其葯效為急性胃腸炎、解熱、興奮、強心、鎮痙、祛痰、防虫、風濕、打撲傷、凍瘡、淋痰、解阿片中毒。葉治跌打傷瘀痛、止血行氣。根味苦、行氣、強心、治胃痛、霍亂腹痛。葉及樹皮煎服治腹痛及痢疾。
產　地：台灣。

編　號：643

青脆枝

別　名：臭馬比木
科　名：茶茱萸科(Icacinaceae)
學　名：*Nothapodytes nimmoniana* (Graham)Mablerley (Nothapodytes foetida (with) Sleumer)
生育特徵：多年生灌木或小喬木，葉互生，葉片卵狀橢圓形至披針狀長橢圓形，全緣。聚散花序或繖房花序，頂生被細毛。白色或黃白色，核果長橢圓狀卵形或卵圓狀，初期綠色，漸轉紫紅色，熟時紫黑色。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根或根皮。
主要成分：生物鹼。
功　效：根或根皮味辛，性溫。有祛風利濕、理氣散寒、抗癌之效。治風寒濕痹、浮腫、疝氣、癌症。
產　地：蘭嶼、台灣山野灌叢林原。

編　號：644

樹蘭



別　名：秋蘭
科　名：楝科(Meliaceae)
學　名：*Aglaia odorata* Lour.
生育特徵：多年生常綠灌木或小喬木，葉為奇數羽狀複葉，長 7-20cm，葉有狹翼，小葉 1-2 對，對生，橢圓形或卵形，全緣，有光澤，先端圓或鈍形，基部銳形，頂生之。小葉梢大。花為圓錐花叢，腋生，黃色，芳香，漿果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、葉及花。
主要成分：花之成分以 param 為主。
功　效：花為茶之香料，葉浸劑為月經過多之強壯劑。根與葉為解熱用。
產　地：中國、馬來西亞、台灣亦植。

編　號：645

大葉咖啡

別　名：利比亞咖啡
賴比瑞亞咖啡、剛果咖啡

科　名：茜草科(Rubiaceae)

學　名：*Coffea liberica* Hiern

生育特徵：多年生灌木近小喬木，葉片對生，長橢圓形或卵形，全緣。花小，白色，芳香 12 月開花，6-7 月果熟呈紅色，採下除果肉，將種子乾燥稱咖啡豆。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種子、葉、樹皮。

主要成分：子含生物鹼 2-3%，主成分咖啡因(Cafieine)，焙焦為嗜好性興奮飲料。種子、葉、樹皮均含咖啡因。

功　效：為興奮劑。

產　地：利比亞、台灣亦植。

編　號：646

楊梅

別　名：珠紅、樹梅、通關散

科　名：楊梅科(Myricaceae)

學　名：*Myrica rubra* Sieb & Eucc.var. *acuminata* Nakai

生育特徵：多年生常綠小喬木，葉叢生枝端，倒卵形或長橢圓形，全緣或上半部有鋸齒。雌雄異株，呈葇荑花序，核果球形，熟時暗紅色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：樹皮。

主要成分：為樹皮含單寧作染料，種仁富含油脂，樹皮含鞣質 15%。

功　效：樹皮為收斂、止血用、治跌打損傷、毒蛇傷，果多汁甘酸，可生食或蜜餞或浸漬楊梅酒，根皮藥用。

產　地：中國、日本、台灣亦植。

編　　號：647

大葉桃花心木

科　　名：楝科(Meliaceae)
學　　名：*Swietenia macrophylla* King
英　　名：Mahogany
生育特徵：多年生喬木，葉偶數羽狀複葉，小葉 3-7 對，斜卵形，全緣。蒴果卵形，種子褐色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：樹皮。
主要成分：樹皮含單寧，樹幹流出樹膠。
功　　效：樹皮為解熱、收斂、強壯。
產　　地：墨西哥、中美洲、台灣亦植。

編　　號：648

風鈴木

科　　名：山茶科(Theaceae)
學　　名：*Eurya japonica* Thunb.
生育特徵：多年生常綠喬木，葉對生，掌狀葉，分五小葉，每小葉呈長橢圓形或橢圓形，葉緣鋸齒，心葉紫色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：莖葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：莖葉祛除風濕、止血消腫。治風濕關節痛、腹水、外傷出血。
產　　地：日本、台灣亦栽培。

編　　號：649

木蓮花

別　　名：木蘭、辛夷、紫玉蘭
木華、房木、木蓮樹

科　　名：木蘭科(Magnoliaceae)

學　　名：*Magnolia liliflora* Desr.

生育特徵：為多年生灌木植物。葉片廣卵形，長橢圓形。花腋生，大型，淡黃色。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：花蕾、樹皮。

主要成分：生物鹼。

功　　效：葯用為花蕾、樹皮，其味辛溫，散風濕、鎮痛、頭痛、肥厚性鼻炎、鼻竇出膿症。消炎益肺、和氣、濕痛、不孕。其皮煎汁，洗陰下濕癢。

產　　地：中國、日本、台灣亦栽植。

編　　號：650

玉蘭花

別　　名：應春花、望春花
白玉蘭、木花樹
迎春花、玉春、黃玉蘭

科　　名：木蘭科(Magnoliaceae)

學　　名：*Magnolia denudate* Desr

生育特徵：多年生木本植物，係屬喬木。葉互生，葉長橢圓形。花腋生，單花，黃色。種子紅色。花蕾乾燥稱辛夷。花芽稱筆花，辛夷花。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：花蕾及樹皮。

主要成分：花含油精，樹皮含厚朴箭毒素(magnocurarine) Salicifoline 及不明生物鹼。根含magnoflorine。

功　　效：藥用採花蕾及樹皮，為治鼻理肺氣、風熱頭痛、解肌。

產　　地：中國、韓國、印度、台灣亦有栽植。

編　號：651

錫蘭肉桂

別　名：錫蘭桂皮

科　名：樟科(Lauraceae)

學　名：*Cinnamomum zeylanicum* Bl.

生育特徵：多年生常綠喬木，嫩枝四稜形，灰色帶有白斑紋。芽有毛葉具濃肉桂味，革質對生，卵形或卵狀披針形，幼嫩時呈紅紫色，葉緣有時呈波狀，長 6-17cm，寬 3-7cm，背面呈褐紫色，主脈 3 條。花為圓錐狀花序，花小呈淡黃色，兩性或雜性。果實卵形，成熟時黑色。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：樹皮與種子。

主要成分：皮含桂皮油 0.5-1%。

功　效：樹皮與種子為中藥上有名藥材，亦為香料用。種子含桂丁，為芳香健胃劑。

產　地：廣東、印度、錫蘭、台灣各地亦有種植。

編　號：652

酸棗仁

別　名：酸棗、小酸棗仁、酸棗核

科　名：鼠李科(Rhamnaceae)

學　名：*Zijyphus jujuba* Mill var *spinasa* Hance

英　名：Willd Jujube

生育特徵：多年生灌木，本變種與棗相似，為枝具刺，果實較小，味酸，核鈍頭或銳尖以區別之。樹枝棘針有兩種，一種為針形，長約 2cm，一種為反曲狀，長約 5mm，葉長橢圓形至卵狀披針形。花黃綠色，腋生。果實長圓形或近圓形，暗紅色。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：仁之成分含脂肪油、Betulin $C_{30}H_{50}O_2$，Betulic acid $C_{30}H_{18}O_3$。酸棗在本經上品，其氣味酸，平，無毒。

功　效：治心腹寒熱、邪結氣聚、四肢酸痛溼痺、久服安五臟、輕身延年、心煩不得眠、臍上下痛、血轉久洩、虛汗煩渴、補中益肝氣、堅筋骨、助陰氣、令人肥健、筋骨風。

產　地：中國、台灣亦植。

編　號：653

紅棗（平底圓形）

別　名：大棗、蜜棗

科　名：鼠李科(Rhamnaceae

學　名：*Zijyphus jujube* Mill var *inernis* Rehd

生育特徵：多年生之大灌木或喬木。枝紅褐色，光滑，具細長的刺，一種刺直立，有時達 3cm，另一種反曲成?狀，葉長圓狀卵形至卵狀披針形，少有卵形者，長 2-6cm，邊緣具細鋸齒。花黃綠色，花果期 5-10 月。果為核果，暗紅色。為平底圓型果實。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：含醣類、粘液質、蘋果酸等。

功　效：果實供保健食用及補氣強壯用。

產　地：中國、台灣亦有植。

編　號：654

紅棗（尖底長型）

別　名：大棗、刺棗
樹棗、棗子、棗酸

科　名：鼠李科(Rhamnaceae)

學　名：*Zizyphus jujuba* Mill

英　名：Indian Jujube,Chinese Date,Hairy Juzube

生育特徵：多年生之大灌木或喬木，枝紅褐色，一種刺直立，另一種反曲成鉤狀，葉長圓狀卵形至卵狀披針形。花黃綠色，果為核果，暗紅色。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：樹皮及種子、果實、葉及根。

主要成分：果實之核仁稱酸棗仁、棗仁。果實含粘液質(Mucilage)、糖(sugar)、棗酸(Zijyphic acid)蛋白質及脂肪等，果皮含鞣質(Tannin)葉含棗素(Zijyphine)。

功　效：紅棗為本經上品，生棗氣味甘辛、熱、無毒。多食令人寒熱，不可多食。紅棗治虛汗、小兒盜汗、緩和、強壯、清血、助消化。樹皮及種子治腹瀉。根解熱、治創傷。樹皮及葉為收斂、腹瀉、痢疾。

產　地：中國、台灣亦植。

編　號：655

紅豆杉

別　　名：台灣紅豆杉

科　　名：紫杉科(Taxaceae)

學　　名：*Taxus celebica* (warburg) Li

生育特徵：為多年生裸子植物，是台灣貴重針葉五木之一，木材品質優異，被分類為針一級木，分屬高大的喬，果為包被紅色假種皮的果實，狀如紅豆。木材樹心為紅色，邊緣為黃色，為很好的雕刻用材。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：材、枝葉。

主要成分：其材含 sciadopitysin、紫杉醇。

功　　效：為治糖尿病之特效藥及抗癌藥物。

產　　地：中國、台灣。

編　號：656

山胡椒

別　　名：山雞椒、山蒼樹、賽樟樹
乾果樹、香葉、畢澄茄
野胡椒、山番椒。

科　　名：樟科(Lauraceae)

學　　名：*Litsea cubeba*(Lour.)Persoo

生育特徵：為多年生落葉灌木或小喬木。葉互生，披針形或長橢圓狀披針形，全緣。花單性，繖形花序，單生或聚生。黃白色，毛緣，核果漿果狀，球形，初青熟黑。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果、根。

主要成分：樹皮含 laurotetanine 及 N-methy Haurotetanine 二種生物鹼。

功　　效：花果有溫脾暖胃、健胃消食、止嘔噦逆、暖腰膝、壯陽、風邪、治面寒疼痛、痰癖冷氣、食積氣脹、脾腹冷痛、反胃嘔吐、霍亂吐瀉、痢疾、腎氣膀胱冷、陰痿。根祛風除濕、理氣止痛、息肝風、理筋骨之效。治感冒、胃痛、腳氣、風濕脾痛、周身筋骨痛、孕婦水腫、產後腳軟、風寒發疹。

產　　地：印度、東南亞、爪哇、中國、硫球、台灣亦產。

編　號：657

竹柏

別　名：山杉、木沙杉
百日青

科　名：羅漢松科(podocarpaceae)

學　名：*Podocarpus nankoensis* Hay

生育特徵：為多年生常綠喬木，葉對生，披針形至橢圓形，厚革質，無葉。雄毬花腋生圓柱形，長 0.5-0.7cm，種實球形，腋生，熟時深藍色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉。

主要成分：樹皮含單寧，可作染料，木材用於建築,家具雕刻與造紙等原料。枝葉含精油可防腐。

功　效：葉治氣管炎、關節炎。

產　地：台灣栽植。

編　號：658

銀葉板金

別　名：銀葉樹、銀葉板根

科　名：梧桐科(sterculiaceae)

學　名：*Heritiera littoralis* Dryard

生育特徵：為多年生常綠性大喬木，樹幹基部常有顯著之板根。葉片背面密被銀白色鱗片，且散生褐色痂鱗。花序圓錐狀，單性，果實長橢圓形，木材供建築及製造家具等，嫩樹皮含纖維，可製繩索。板根之形成主要為了協助固著植物體，故稱銀葉板根或銀葉板金。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種子。

主要成分：生物鹼。

功　效：種子收斂劑、治腹瀉。

產　地：台灣。

編　號：659

土樟

科　名：樟科(Lauraceae)

學　名：*Cinnamomum reticulatum* Hayata

生育特徵：多年生小喬木，葉小形，對生或亦有互生，倒卵形或倒卵狀長橢圓形。革質，全緣，葉表有光澤綠色，背面蒼綠色。花小，淡黃綠色，腋生，聚繖花序，核果橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、幹、葉。

主要成分：葉含樟腦(camphor)及樟腦油，材含樟油0.5-3%，主成份cineol5-6%，葉含樟油 0.5-1%，主成份 safral10%。

功　效：採根、幹祛風止痛，主治腹痛、急性胃腸炎、皮膚病、心腹痛、霍亂腹脹、行氣強心。根葉治跌打傷瘀痛、止血行氣、治腹痛、痢疾。

產　地：台灣南部恆春地區。

編　號：660

相思豆

別　名：相思子、紅豆
郎君豆、鴛鴦豆、雞母珠。

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Abrus precatorius* Linn.

生育特徵：為纏繞性藤本，葉互生，羽狀腹葉，長 5-12cm，葉片長圓形至長圓狀倒卵形全緣。花總狀花序，腋生，淡紫色。夾果為長亦狀橢圓形，花果期夏至冬。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、藤莖葉、果實、種子。

主要成分：全株含甘草甜素。

功　效：全年採根、藤、果實。根有清熱利尿之效。治咽喉腫痛、肝炎、黃疸、支氣管炎。藤莖葉有生津、止渴、潤肺、清熱利尿之效。治喉痛、肝炎、支氣管炎、乳瘡。種子能通九竅。

產　地：中國、琉球、印度、西印度、非洲及美洲、台灣亦栽植。

編　號：661

小葉木樨

別　名：木樨、丹桂
山桂花、銀桂

科　名：木樨科(Oleaceae)

學　名：*Osmanthus marginatus* Champion ex Bentham Hemsley

生育特徵：多年生常綠灌木或小喬木，葉密集生於莖上端，對生，革質，橢形至橢圓狀披針形。花序簇生於葉腋、嫩莖、老莖均可見花，花白色至淡黃色，極香，核果橢圓形，熟時紫黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：花、果及根。

主要成分：花含芳香物質，如 r-癸酸內酯，α-紫羅蘭酮(α-ionone)等。

功　效：採花、果及根當藥用。秋季採花，冬季採果，四季採根。花性溫，散寒破結，化痰止咳、提神醒腦。果甘、性溫、健胃。根味甘、微澀性平、祛風溼。為治牙痛、咳喘痰多、經閉腹痛、虛寒胃痛、風溼筋骨痛、腰痛。

產　地：中國西南部、台灣亦栽植。

編　號：662

軟毛柿

科　名：柿樹科(Ebenaceae)

學　名：*Diospyros eriasntha* Champ.et Benth

生育特徵：為多年生落葉性喬木，葉互生，葉片橢圓形至倒卵形，花聚繖花序，雌花單生，腋出。花黃白色，果子漿果，球形或卵狀球形，熟時橙黃色或橙紅色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉、果實、樹皮及柿霜、柿漆、柿蒂。

主要成分：根含強心苷、皂苷、鞣質、澱粉。葉含黃酮苷、鞣質、酚類、樹脂、多糖、揮發油、機酸。果實含蔗糖、葡萄糖、果糖。

功　效：根有涼血、止血之效。治血崩、血痢、痔瘡。樹皮治下血、燙火傷、葉治咳喘、肺氣脹、各種內出血及瘡傷。柿霜清熱、潤燥、化痰。治肺熱燥咳、咽乾喉痛、口舌生瘡、吐血、咯血、消渴。柿漆治高血壓。柿蒂降逆氣、止嘔逆。

產　地：台灣。

蘭嶼肉荳蔻

編　　號：663

科　　名：肉荳蔻科(Myristicaceae)

學　　名：*Myristica ceylanico*.A.De. Candolle var. *cagayanensis* (Morrill)J.Sinclair

生育特徵：多年生宿根草本，葉廣披針形，花頂生，白色花，結蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種仁和假種皮。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採種仁和假種皮，味辛、苦、性溫。有溫中行氣、健胃消食之效。治脘腹脹滿、食少嘔吐。種子搗碎外敷治酸痛、除頭蝨。

產　　地：蘭嶼、新竹。

青剛櫟

編　　號：664

別　　名：木諸、梭欑、九欑

科　　名：殼斗科(Fagaceae)

學　　名：*Quercus glauca* Thunb.

英　　名：Ring Cupped Oak

生育特徵：為多年生常綠喬木，嫩葉及嫩枝有絹毛。葉長卵形，上下有粗齒，上綠下白，果腋生，單一，果橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果仁、根皮、及嫩葉。

主要成分：樹皮含單寧、灰分。種子含油。

功　　效：據本草綱目載：仁苦、澀平、止渴、破惡血、治下痢、令人不肌、健行。皮煮汁飲止炙婦血。取嫩葉療瘻瘡。

產　　地：台灣、中國、日本、印度。

編　號：665

白水木

別　名：水草、山埔姜、銀丹、砂引草
科　名：紫草科(Boraginaceae)
學　名：*Messerschmidia argentea*(Linn.) Johnston.
生育特徵：多年生常綠灌木至小喬木，幼枝、葉及花序皆被銀白色絹毛。葉互生，輪生狀，葉片倒卵形或匙形，全緣。花聚撒花序，頂生，細小，白色或乳灰白色。果為核果，花果期 4-8 月。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根及莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：根及莖有清熱、利尿、解毒之效。治風濕骨痛。葉有解毒，消腫之效。治解魚類、貝類中毒。
產　地：澳洲、太平洋諸島、台灣恆春、蘭嶼、綠島、小琉球等地亦產。

編　號：666

姑里珍

別　名：枯里珍、五蕊山巴豆
科　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　名：*Antidcsma pentandrum* Merrill var. *barba* Gcn(presl)Merrill
英　文：Five-Stamens china laurel
生育特徵：多年生灌木或小喬木。葉互生，全緣。長橢圓形或長橢圓狀倒卵形，先端銳尖或鈍，頂生，穗狀或總狀花序。果為核果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根、葉，味酸，性平。有生津止咳、活血、解毒之效。治咳嗽口渴、跌打損傷、瘡毒。
產　地：蘭嶼海岸邊、新竹。



編　號：667

蘭嶼樹

別　名：蘭嶼柿

科　名：柿科(Ebenaceae)

學　名：*Diospyros kotoensis* Yamajaki

生育特徵：多年生喬木，葉互生，橢圓形至長橢圓形，全緣。花腋生，漿果，熟時橙色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉。

主要成分：葉含東莨岩素(Scopletin)，齊敦果酸(okanolic acid)等。

功　效：有降血壓作用。果可食用。

產　地：蘭嶼、新竹。

編　號：668

蓮葉桐

別　名：臘樹、血桐

科　名：蓮葉桐科(Hernandiaceae)

學　名：*Hernandia ovigera* L.

英　名：Jack-in-the-box.

生育特徵：為多年生常綠喬木，葉互生，圓心臟形、楯形,全緣，光滑。花單生，腋生，繖房花序，核果球形種子球形，皮堅硬。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、種子。

主要成分：種子及樹皮含生物鹼。種子含油 18 %。

功　效：種子為瀉劑，油製肥皂，橡膠代用品等原料。根有解毒、治創傷。莖治出血。

產　地：日本、南洋群島、澳洲、馬達加斯加島、台灣恆春海邊亦有。

黃厚殼

編　　號：669

別　　名：台灣厚殼樹、恆春厚殼樹、厚殼樹、厚殼仔、山檳榔。

科　　名：紫草科(Boraginaceae)

學　　名：*Ehretia resinosa* Hance

英　　名：Taiwan hou-k'o-shu.

生育特徵：為多年生灌木至小喬木，幼枝葉密生毛，葉互生，倒卵狀橢圓形或卵形，先端尖或突尖形，全緣或波狀緣。花聚繖花序，頂生，白色，核果球形熟時黃色。花果期 1-8 月。

繁殖方法：實生法繁殖亦可用扦插繁殖。

利用部位：根、樹皮。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採用根、樹皮有祛瘀生新、止痛生肌、收斂止瀉之效。治跌打損傷、腫毒、癰瘡、腸炎腹瀉。亦可採幼葉嚼食味澀而甘，液汁棕褐色，故民間習稱山檳榔。

產　　地：中國廣西、菲律賓、台灣南部、恆春半島及東部等地海岸至山麓。

蘭嶼樹杞

編　　號：670

別　　名：蘭嶼紫金牛

科　　名：紫金牛科(Myrsinaceae)

學　　名：*Ardisia elliptica* Thunberg

生育特徵：多年生常綠小喬木，葉片革質，長橢圓形或倒卵形，全緣。聚繖花序組成複繖花序，腋生或頂生，花白色至淡紅色。果實球形，熟時深紅色漸變紫黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、莖、枝葉。

主要成分：根皮含紫金牛苷A、B、C(ardisiaguinoneA、B、C)，樹皮含酸紫金牛苷(rapanone)果實含bladhianin。

功　　效：採根、莖有清熱解毒、消腫、收斂之功。治肺炎、支氣管炎、咽喉腫痛、久年傷、跌打損傷。枝葉有收斂、止瀉之效。治出血、下痢。

產　　地：蘭嶼。

編　號：671

火桐樹

別　名：火筒樹、蕃婆怨
蕃婆樹、蕃婆松、紅吹風

科　名：火桐樹科(Leeaceae)

學　名：*Leea gunineensis* G. Don

英　名：Huo-t'ung-shu

生育特徵：多年生常綠小喬木。葉互生，3-4回羽狀複葉，小葉對生，披針形、卵形或卵狀橢圓形，鋸齒緣，葉脈明顯。花聚繖花序，腋生。花淡綠色漸變紅色。漿果扁球形，熟時紅色至深紅色後變黑色。

殖 方 法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：根有清熱除溫、收斂生肌之效。治風濕痺痛。葉有解毒、消腫、生肌之效。外用治瘡瘍腫毒。

產　地：菲律賓、加羅柱群島、台灣亦栽植。

編　號：672

五葉松

別　名：台灣五松葉、山松柏
短毛松、五釵松

科　名：松科(Pinaceae)

學　名：*Pinus morrisonicola* Hay

英　名：Taiwan short-leaf pine

生育特徵：多年生常綠大喬木，陽性樹，葉五針一束，橫斷面三角形，球果卵狀橢圓形，長 10cm，莖 5cm，果鱗尖端反捲。種子卵形，具刀形薄翅。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉、松果及心葉。

主要成分：生松脂主成分，i-α-pinene80%另含 Terpene alcohol 及 Sesguiterpenem。材部含精油如α-Pinene，Camphene Cineol，Canphor，Limonene，p-Cymenene 等。

功　效：生松脂、松脂、松節油、松溜油、松根油及透明松香等供藥用。葉煎服止咳。松果及心葉供製松果露或松葉露。

產　地：海南、台灣。

編　　號：673

鳥不棲

別　　名：鳥不宿、鳥踏刺
白馬屎、雙面刺、崖椒。

科　　名：芸香科(Rutaceae)

學　　名：*Fagara nitida* Roxb (*Zanthoxylum nitidum* (Roxb)DC)

生育特徵：多年生攀緣性灌木，枝條具短勾刺，奇數羽狀複葉，小葉3-7枚，長橢圓形長 7-8cm，兩面有刺或無，鈍齒牙緣。花總狀花序，腋生，淡黃白色。蒴果球形。種子漆黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根莖。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根莖治腫毒、牙痛、喉痛、跌打、頭痛、腹痛，亦為解毒行血止痛、治花柳病、瘡癤病、蛇傷、肺癰、風溼。

產　　地：中國、台灣等地。

編　　號：674

毛苦蔘

別　　名：嶺南槐

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Sophora tomentosa* Linn

生育特徵：多年生灌木，葉為羽狀複葉，小葉披針形。花穗狀花序，開淡黃色花，莢果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草有清熱利濕、祛痰、消腫止痛、苦味健胃、暖瀉、殺菌止痢之效。治咽喉痛、霍亂、腹瀉、腹痛、膽汁性嘔氣。

產　　地：屏東、蘭嶼等地。

編　號：675

檉柳

別　名：檉柳、雨師、紅筋條
三春柳、觀音柳、西湖柳、無葉檉柳

科　名：檉柳科(Tamaricaceae)

學　名：*Tamarix aphylla* (Linn.) karsten

生育特徵：為多年生常綠灌木至喬木，樹形如針葉樹或木麻黃。多分枝，小枝細長，圓柱狀線形，節狀接合，每節長約 1mm，新枝葉綠色，葉退化成鞘狀，殘存 1 小鱗狀。葇荑花序頂生，小形花，白色或淡粉紅色。蒴果，種子卵形，褐色。花果期 4-9 月。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：枝葉。

主要成分：樹皮含鞣質。

功　效：枝葉有發汗、透疹、解毒、利尿、解熱。治感冒、麻疹不透、皮膚風疹、糖尿病、肝病、風濕關節痛、小便不利。

產　地：非洲東部、北部及亞洲西部之伊朗、阿拉伯等地、台灣亦栽植。

編　號：676

肉桂

別　名：桂仔

科　名：樟科(Lauraceae)

學　名：*Cinnamomum loureirii* Nees.

生育特徵：多年生常綠喬木，葉為廣披針形或長橢圓形。夏天開黃綠色小花，聚繖花序，腋生。漿果橢圓形，黑熟。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：皮、肉桂與桂心。

主要成分：皮含精油 1%，主成分桂皮醛(Cinnamicaldehyde)，Camphene，Cineol，Linalool 及丁香油酸 Eugenol 等。種子含脂肪油 40%。

功　效：皮供藥用。肉桂與桂心為芳香健胃及鎮痛藥、具強心、利尿、治慢性消化不良、胸脹悶、神經性吐瀉、胃腸痙痛、神經性衝逆、動悸、疝痛、胃腸弛緩、子宮弛緩、子宮冷感、膀胱麻痺之尿閉、妊婦尿閉、循環障礙及心臟衰弱之虛脫。

產　地：中國、日本、台灣亦種。

編　號：677

肖楠

別　名：台灣肖楠、肖楠柏
黃肉柏、柏楠梔。

科　名：柏科(Cupressaceae)

學　名：*Calocedrus formosana* (Florin) Florin

生育特徵：多年生常綠喬木，莖幹直立，樹皮紅褐色，有縱向淺溝裂，新生周皮紫紅色，肉皮紅白色，具紫紅色樹脂溝，分泌淡紅色樹酯，葉呈鱗片狀，每四枚合生，呈扁辛狀，雄花生枝頂，雌花直立，毬果圓錐狀橢圓形，種子長橢圓形具兩翅。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、莖。

主要成分：材含 hinokiflarone。

功　效：木材供建築、家具雕刻，木屑具芳香、製線香的主要原料。具提神作用。

產　地：台灣。

編　號：678

沉香

別　名：密香、沉水香

科　名：瑞香科(Thymelaeaceae)

學　名：*Aguilaria agallocha* Roxb

英　名：Chien hsiang

生育特徵：多年生常綠喬木。葉互生，稍帶革質，橢圓披針形、披針形或倒披針形，先端尖，全緣，花繖形花序，白色，蒴果倒卵形。基部具有角狀附屬物，長約種子 2 倍。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：沉香的丙酮提取物(40-50%)經皂化後蒸餾的發揮油 13%及其他沉香醇等。

功　效：沉香脂燃時發出清靈高雅而沉靜的香味，易使人心平氣和進入安祥的狀態，一般沉香樹脂含量濃度愈高的沉香香味愈好，而沉香具有抗菌功能的藥材，能調節體內氣的運行，對疏通內臟機能如肺、腎、肝、胃、腸等非常有效的藥材。治療與功能方面如肺臟（肺結核、氣喘），腎藏（補腎、利尿、壯陽）肝臟(肝炎、肝硬化、肝腫大)，胃(胃潰瘍、胃炎、胃痛)，腸(便秘)。對癌症及其他慢性病亦有療效。

產　地：中國、台灣、廣東、廣西、印度、印尼、越南、馬來西亞。

編　號：679

台灣土生樟樹

別　名：烏樟、山烏樟、臭樟
山臭樟、花樟。

科　名：樟科(Lauraceae)

學　名：*Cinnamomum camphora* var *nomnale* Hay

生育特徵：為多年生常綠小喬木，樹冠圓，葉波曲顯著，內面灰白色蠟粉，花黃白色，7 月結實。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉及樹幹。

主要成分：葉含樟腦量 0.7%，含油量 0.4%。

功　效：採葉及樹幹為製障腦原料。活血化瘀，醒腦提神及鎮靜等作用。

產　地：台灣各地。

編　號：680

圓滑番荔枝

科　名：番荔枝科(Anmonaceae)

學　名：*Annona palustris*

生育特徵：多年生灌木至小喬木之植物，具有芳香的葉和花，開黃綠色花，果實的皮為綠色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果肉和葉、種子。

主要成分：樹皮含單寧。

功　效：其果實可做麻醉劑。果肉和葉可治發燒和腹瀉，葉治壞血病。種子和種子油可製殺蟲劑和毒魚。

產　地：爪哇、非洲及美國熱帶地區、台灣。

香椿

編　號：681

別　名：椿、大紅椿樹

科　名：楝科(Meliaceae)

學　名：*Chinese mahogany*. Chun.

英　名：Hsiang-chun

生育特徵：多年生落葉喬木，幹直立高 20m，葉互生，奇數羽狀複葉，長橢圓形至披針狀長橢圓形，葉尖，無毛。7 月開花，圓錐花序，頂生，花白色，有香氣，蒴果 10-12 月熟，長橢圓形，種子上部有翅。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉、嫩芽及白皮、根皮。

主要成分：葉含蛋白質 5.7%，脂肪 0.4%，樹皮含兒茶酚，蛋單寧 2.4%。

功　效：採葉，苦、澀、無毒、洗瘡疥風。嫩芽可食，消風祛毒。白皮、根皮無毒，治疳虫、赤白痢、收斂、血崩、清血、神經痛、肝脾等病。

產　地：中國、台灣亦栽植。

羅望子

編　號：682

別　名：酸果樹、羅晃子

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Tamarindus indica* Linn

英　名：Tamarind. Indian Date. Chinch.

生育特徵：多年生常綠喬木，葉偶數羽狀複葉，對生，橢圓形。花總狀花序，淡黃色，棕褐色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果實、果肉、及種子、樹皮和嫩葉。

主要成分：種子含維生素 15.61%，樹皮含單寧，果實含維他命 A、B、C。灰分富鈣、磷。

功　效：為治熱病、下疾、通經絡、療小兒疳病。果味甘澀、明目去翳、退熱止渴、降水消煩、養肝胆、解利風邪、翻胃吐食。果肉為緩瀉、清涼、健胃、止嘔。種子可治痢疾。樹皮健胃、收斂。嫩葉驅蟲、解熱、治風濕骨痛。治療及預防壞血病。

產　地：熱帶非洲及亞洲南部、台灣、新竹。

編　號：683

香水樹

別　名：花中花
科　名：番荔枝科(Amonaceae)
學　名：*Canangium odoratum* Baill
英　名：Ylang-ylang.
生育特徵：多年生常綠喬木，為舉世聞名之香料，葉卵狀長橢圓形，全緣，背有毛，花腋生，單生或叢生，下垂，香氣極濃，初淡綠，後黃色，長4-7.5cm，漿果黑色，種子 6-12 粒。

繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：樹皮及根、種子和葉、花。
主要成分：花含精油 1.5%，主成分醋酸及安息香酸之 Geraniol 及 Linalool 脂，p-cresol 之 Methtyl ether 及 Benzoic acid 之酯。
功　效：樹皮及根治痢疾、頭皮屑。花治瘧疾、哮喘。種子外用治間歇熱，葉搽癬。
產　地：菲律賓、爪哇、馬來、緬甸、台灣亦栽植。

編　號：684

蛋樹

別　名：香港倒捻子
科　名：福木科(Guttiferae)
學　名：*Garcinia xanthochymus* Hook. F.
英　名：Garcinia,Egg-tree
生育特徵：多年生常綠灌木狀小喬木，株高 8-10m，直徑 20-30cm，樹冠圓錐形，嫩葉黃綠色。葉大型，革質，全緣，對生。長卵形或卵狀長橢圓形，長 25-40cm，寬 8.5-18cm，先端短尖。花雌雄異株，不時開花，花期 6 月較集中，花為淡黃色。漿果，果實 116-211cm，熟時黃色，內種子 3-5 顆，種子橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果汁。
主要成分：樹皮含黑色素可染棉成黑色。
功　效：果汁作糖漿，治肝病。
產　地：印度、台灣亦栽植。

編　　號：685

西印度醋栗

別　　名：小果餘甘子、小油甘

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Llanthus phyacidus* Skeels

生育特徵：多年生灌木至小喬木，葉互生，羽狀複葉，葉片長圓形至長卵形，全緣，光滑無毛。花穗狀花序，單性花或兩性花。黃綠色，果扁球形，淡黃色。種子 1 粒。花果期 3-9 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根皮、葉及果和樹皮。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根、樹皮、葉供藥用。根皮有收斂、化瘀、降血壓。葉清熱、解毒。外用治痔漏、疔瘡、皮膚濕疹。果有潤肺、化痰、生津、消積、強壯之效。治咳嗽、咽喉痛、胃炎、腹脹、消化不良、體力衰弱。果實供製果汁、果醬、密餞等。

產　　地：印度、馬來西亞、台灣亦有栽植。

編　　號：686

草莓番石榴(白)

別　　名：榕仔芭

科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)

學　　名：*Psidium littorale* var. *langipes*

英　　名：Psidium cattleianum

生育特徵：多年生常綠小灌木，葉倒卵形，葉具平行葉脈，白色花單生，結的果實比番石榴小而甜，栗色的果實。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉片和樹皮、根及葉。

主要成分：富含維生素 C 和鐵。

功　　效：果生吃，燉食及醃食，為緩瀉藥，葉片和樹皮可治消化不良、腹瀉。採根治痢疾，葉治牙痛。

產　　地：熱帶美洲、台灣、新竹。

編　號：687

錫蘭橄欖

別　名：鋸葉杜英、西洋橄欖、欖仔、青欖

科　名：膽八樹科(Elaeocarpaceae)

學　名：*Elaeocarpus serratus* L.

生育特徵：多年生常綠喬木，葉不規則互生，長橢圓形至披針形。花總狀花序，腋生，白色。核果橄欖形，粉綠色。種子長橢圓形，兩端尖，種皮堅硬，淡黃褐色。花果期 6-2 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、果

主要成分：果含粗脂肪，還原糖，非還原糖，果膠(pectin)。

功　效：果實可供食用加工罐頭。採根治胃痛，果為解熱去毒、肝熱、疏肝風邪等。種仁含油分不作食用油或工業用油。

產　地：熱帶、錫蘭、台灣亦栽培。

編　號：688

阿勃勒

別　名：黃金雨

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Cassia fistula*

生育特徵：多年生落葉或半常綠熱帶喬木，葉呈長橢圓形，葉柄上生長 4-6 對鮮綠色的小葉。花總狀花序，能不斷開花，黃色並結出光滑且內含黑褐色種子的長莢果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、花及葉。

主要成分：灰色樹皮具隆起的木栓斑塊，富含單寧。

功　效：種莢內果肉具輕瀉劑，花及葉亦作瀉劑，根治疥癬和清除潰瘍，樹皮用於鞣製皮革，染料和醫藥。

產　地：熱帶、亞熱帶、孟加拉、印尼及非洲等地、台灣、新竹。

編　號：689

波羅蜜

別　名：波羅蜜樹

科　名：桑科(Moraceae)

學　名：*Artocarpus heterophyllus* Lam.

生育特徵：多年生常綠喬木，株高 15m，圓形有光澤的綠葉呈螺旋狀排列，灰褐色樹皮長著綠色的地衣。從樹幹長出廣橢圓形巨大綠色果實，可達30kg重。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、花、果。

主要成分：生物鹼。

功　效：果醒酒，仁補中。益氣通乳、治產後乳少、乳汁不通、脾胃虛弱。白色的果肉可生吃、煮吃、醃漬或做美味醬。幼葉當菜吃，幼果入湯。爪哇人採嫩花束和糖漿，和石花菜混著吃，種子加入咖哩，在泰國根被用以治療腹瀉，花治糖尿病，果收斂和緩瀉。

產　地：印尼、馬來西亞、泰國、台灣亦產。

編　號：690

鴉膽子

別　名：苦子、苦胆子

科　名：苦木科(Simarubaceae)

學　名：*Brucea javanica* (L.) Merr.

生育特徵：為多年生灌木，直立性枝葉有黃色細毛，樹皮苦味，葉為奇數羽狀複葉，小葉片 7-13 片，一般 7 片，長卵形、披針形，邊緣有粗齒，表面綠色，背淡綠色。花腋生，圓錐狀聚繖花序，花極小，黃綠色。果長卵形，熟時黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種仁。

主要成分：含精油。

功　效：白露時採收成熟果，晒乾，除去外殼，留種仁用。有油性，味極苦。為清熱、殺虫。治阿米巴痢、間日瘧、皮膚贅疣、足底雞眼、耳痔、月經過多。

產　地：中國大陸、台灣亦產。

編　號：691

絨毛羊乳頭（牛乳榕）

別　名：天仙果、牛乳榕
牛乳房、牛奶榕、鹿飯
三麹、漿乳仔、大丁黃
科　名：桑科(Moraceae)
學　名：*Ficus erecta* Thunberg var. *beecheyana*
生育特徵：為多年生灌木或小喬木，生於山麓林中。葉長橢圓形至披針形，花腋生，漿果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、莖、葉、果。
主要成分：生物鹼。
功　效：根、莖、葉、果有益氣、活血、通絡、祛風除溼、潤腸通便、解毒消腫。
產　地：台灣、新竹。

編　號：692

澳洲茶

別　名：茶香百千層
科　名：桃金娘科（Myrtaceae）
學　名：*Melaleuca alternifolia*
生育特徵：多年生常綠灌木至小喬木，葉針形至長披針形，全緣，耐寒-1-35，為一種耐旱植物。
繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。
利用部位：葉片。
主要成分：精油主成分為 1.8-cineolene、terpinolene 及 pinene 衍生物等。
功　效：葉片含芳香精油。可利用葉片汁液塗抹傷口，助傷口癒合防止菌類感染。其精油為抗氧化驅蟲活性，可應用牙膏、化妝品、肥皂等用途。在澳洲為一種嗜好性飲料茶，清涼退火之保健飲料用。
產　地：澳大利亞、台灣、新竹。

編　號：693

咖啡樹

別　名：荷蘭咖啡樹
科　名：茜草科(Rubiaceae)
學　名：*Coffea arabica* L.
生育特徵：多年生灌木或小喬木，葉長橢圓形或卵形，對生。花腋生，小，白色。花後6-7 月果實成熟，為金紅色，漿果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：種子、葉及花。
主要成分：其種子、葉及花含咖啡因，種子含 trigonelline。
功　效：種子為健胃、興奮劑。
產　地：非洲、台灣栽植。

編　號：694

石榴

別　名：紅石榴、謝榴、白石榴
科　名：安石榴科(Punicaceae)
學　名：*Punica granatum* Linn.
英　名：Pomegranate
生育特徵：多年生落葉灌木或小喬木，葉對生或叢生，長橢圓形或倒卵形，花紅色。果球形深黃色，種子多，外附肉質外種皮。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：石榴皮、根及榴花、葉。
主要成分：樹皮及根皮含生物鹼 1%，主成分為石榴皮鹼(pelletierine)等。果實含果皮有生物鹼、蛋白質、脂肪等。果肉種子約佔 29-42%，果汁 36-61%。

功　效：石榴皮為治頑惡心、嘔吐、腹痛及殺虫、殺菌，根亦同效。榴花、葉治心熱吐血。石榴皮在止瀉及收濇腸部，收斂腸膜，石榴亦可搾汁染黑髮。
產　地：地中海岸、亞熱帶、溫帶、中國及台灣有種植。

編　　號：695

羅晃子

別　　名：羅望子、酸果樹
　　　　　九层皮果
科　　名：豆科(Leguminosae)
學　　名：*Tamarindus indica* Linn.
英　　名：Tamarind
生育特徵：壽命很長的常綠喬木，葉為對生的卵形小葉，組成羽狀複葉，具收斂性。芳香的花呈乳白色，為總狀花序，成熟的革質果莢。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：樹皮、種子及花。
主要成分：果膠、維生素、礦物質。
功　　效：葉具收斂性。浸泡過的果肉有水果的酸甜香味，成熟的果莢含有可口的酸味果肉。樹皮可治氣喘病。種子種子葉可減輕膿腫，種子治腹瀉，花能降血壓。果肉可入中藥，保健食品中即有辣醬油和苦味的樹皮酒。
產　　地：印度、台灣、新竹栽植。

編　　號：696

刺葉桂櫻

別　　名：刺葉櫻
科　　名：薔薇科(Rosaceae)
學　　名：*Prunus spinulosa* Sied.et Zucc.
生育特徵：多年生常綠小喬木，幼枝常有毛，成長後無毛。葉狹長橢圓形或狹倒卵形先端短尾狀銳尖或銳尖，幼樹多為芒尖狀細鋸齒。花白色，密生，總狀花序，核果橢圓形或闊卵形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果。
主要成分：生物鹼。
功　　效：果治遺精、遺尿、小便頻繁、腸炎久痢。
產　　地：日本、台灣亦植。

編　號：697

威氏粗榧

別　名：台灣粗榧、台灣三尖杉

科　名：粗榧科 Cephalotaxceae

學　名：*Cephalotaxus wilsoniana* Hayata

生育特徵：多年生喬木，樹皮暗紅褐色，小枝對生。葉線形或線狀披針形，排成二列，似對生，先端銳尖，基部漸狹，葉緣反捲。花單生，種子橢圓形或倒卵狀橢圓形，熟時紫褐色。花果期 6-11 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：枝葉、種子。

主要成分：生物鹼。

功　效：粗榧枝葉含生物鹼對血癌、淋巴瘤、惡性腫瘤、各種癌症均有效。種子有驅虫、消積之效。治蛔虫病、鉤虫病、食積。

產　地：印度、日本、中國及台灣、新竹。

編　號：698

土番石榴

別　名：土那拔、藍拔
那菝、扒仔、拔仔

科　名：桃金孃科(Myrtaceae)

學　名：*Psidium guajava* Linn.

英　名：Guava

生育特徵：多年生常綠小灌木或小喬木，單葉，對生，卵狀長橢圓形或長卵形，細小，花單生於新梢葉腋，為聚繖花序，清香。果形因品種不同有球形，橢圓形、卵圓形及洋梨形等，未熟綠果，熟時呈黃色、綠黃色或帶紅色等，果肉有白色、淡紅色、黃色等。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：皮、根、葉及果實。

主要成分：樹皮含焦性沒食子鞣質。葉含精油 0.37%，主成分 Eugenol，尚含鞣質 9%，樹脂、脂肪等。果實灰分特多，鐵含量高，亦含鈣及磷，維生素 A、B 糖 4%，種子含灰分、脂肪油 13.37%，蛋白質 15%，澱粉 13%。

功　效：皮治濕毒瘡疥。根止牙痛。葉主收斂、治痢疾、治潰瘍創傷、解熱。果實驅虫及治糖尿病。

產　地：熱帶美洲、台灣亦種植。

編　號：699

檄樹（大溪地一號）

別　名：水冬瓜、海巴戟天

科　名：茜草科(Rubiaceae)

學　名：*Morinda citrifolia* L.

生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生,橢圓形，長 24.4cm，寬 10.3cm，兩端銳，頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。

功　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。

產　地：大溪地、台灣、新竹。

編　號：700

檄樹（大溪地二號）

別　名：水冬瓜、海巴戟天

科　名：茜草科(Rubiaceae)

學　名：*Morinda citrifolia* L.

生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生，橢圓形，長 24.3cm，寬 10.4cm，兩端銳，頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。

功　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。

產　地：大溪地、台灣、新竹。

編　號：701

檄樹（大溪地三號）

別　名：水冬瓜、海巴戟天
科　名：茜草科(Rubiaceae)
學　名：*Morinda citrifolia* L.
生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生，橢圓形，長21cm，寬7.6cm，兩端銳，頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。
利用部位：全株。
主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。
功　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。
產　地：大溪地、台灣、新竹。

編　號：702

檄樹（馬來西亞四號）

別　名：水冬瓜、海巴戟天
科　名：茜草科(Rubiaceae)
學　名：*Morinda citrifolia* L.
生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生，橢圓形，長25.4cm，寬11.2cm，兩端銳，頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。
利用部位：全株。
主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。
功　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。
產　地：馬來西亞、台灣、新竹。

檄樹（夏威夷五號）

編　　號：703

別　　名：水冬瓜、海巴戟天

科　　名：茜草科(Rubiaceae)

學　　名：*Morinda citrifolia* L.

生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生，橢圓形，長20.5cm，寬9.9cm，兩端銳，頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。

功　　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。

產　　地：夏威夷、台灣、新竹。

檄樹（本地第六號）

編　　號：704

別　　名：水冬瓜、海巴戟天

科　　名：茜草科(Rubiaceae)

學　　名：*Morinda citrifolia* L.

生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生，橢圓形，兩端銳，頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。

功　　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。

產　　地：屏東、恆春海岸、蘭嶼、新竹等地。

編　號：705

檄樹（本地第七號）

別　名：水冬瓜、海巴戟天

科　名：茜草科(Rubiaceae)

學　名：*Morinda citrifolia* L.

生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生，橢圓形，長 24.1cm，寬 7.7cm，兩端銳，頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。

功　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。

產　地：屏東、恆春海岸、蘭嶼、新竹等地。

編　號：706

檄樹（本地第八號）

別　名：水冬瓜、海巴戟天

科　名：茜草科(Rubiaceae)

學　名：*Morinda citrifolia* L.

生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生，橢圓形，長 24.1cm，寬 9.5cm，兩端銳頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。

功　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。

產　地：屏東、恆春海岸、蘭嶼、新竹等地。

編　號：707

檄樹（本地第九號）

別　名：水冬瓜、海巴戟天

科　名：茜草科(Rubiaceae)

學　名：*Morinda citrifolia* L.

生育特徵：常綠小喬木，全株光滑，葉對生，橢圓形，長 24.0cm，寬 10.3cm，兩端銳，葉凹捲。頭狀花序，單生，腋生，花白色，聚合果球形。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：主成分為單寧卡及賽洛寧。

功　效：全株根、莖、葉、花果均可分開或混合使用。為消炎退癀、恢復疲勞、增強體力。並為美容、潤膚之美容聖品。且在預防癌及抗癌上有其獨特之藥效。

產　地：屏東、恆春海岸、蘭嶼、新竹等地。

編　號：708

辣木

別　名：山葵樹

科　名：辣木科(Meringaceae)

學　名：*Moringa oleifera* Lamk.

英　名：Horseradish tree Ben tree

生育特徵：多年生落葉小喬木，葉對生，奇數三回羽狀複葉，小葉卵形或倒卵形，花白色，圓錐花序，有臭氣。種子三稜角，具翼。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根及樹皮、種子、花和莢果。

主要成分：材及根含生物鹼。種子含生物鹼及皀素。種子含油 36%，主為 Oleic acid，Palmitic acid，Stearic acid 之甘油酯 Glycerides。

功　效：根為辛辣，刺激及利尿劑，外用為引毒藥。根皮煎劑混阿魏及岩鹽治炎症、膿瘍及結石病患。根汁及奶作利尿劑，治石淋、助消化，對哮喘亦效。根及樹皮為墮胎劑，外用為引毒發泡劑。歐人以根為山葵代用品。種子治花柳病。花去寒濕、消腫、強壯及利尿。莢果驅虫，用為刺激藥治痲瘋病患及間隙熱，亦治癲癇及癔病。果為肝及脾疾患、關節疼痛、痙攣劑及麻痺藥。種子具刺激性，治肝及脾腫之腹水及花柳病，其油塗僂麻質斯，樹膠混芝麻油倒入耳內治耳痛。樹膠治齒骨疽、墮胎。葉汁摧吐。

產　地：印度，台灣、新竹引進。

編　　號：709

黃金果

別　　名：黃晶果、黃星蘋果
加蜜蛋黃果

科　　名：山欖科(Sapotaceae)

學　　名：*Pouteria caimito* Radik

英　　名：Abju Caimito

生育特徵：多年生常綠果樹，喜溫暖潮濕之氣候，溫度在 10℃以上，20-35℃最適合。喜肥沃，排水良好之地。產果期在 2-4 月及 7-8 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：醣類。

功　　效：果肉乳白色半透明，未熟果有澀味，熟後甜而芳香，甜度 12-15%，為清香可口、解渴、利尿之效。

產　　地：中南美洲、台灣亦植。

編　　號：710

毛鉤藤

別　　名：台灣鉤藤

科　　名：茜草科(Rubiaceae)

學　　名：*Lincaria hirsuta* Haviland.

生育特徵：多年生常綠灌木至小喬木，每葉柄均有一對鉤鉤即卷鬚，葉有毛，對生，橢圓形，先端急尖，全緣。

繁殖方法：實生法繁殖及扦插繁殖。

利用部位：卷鬚、根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採鉤鉤即卷鬚可治小兒驚癇、成人頭暈目眩。亦治老年人高血壓、清熱平肝、熄風定驚。
根有舒筋活絡、清熱消腫。治關節風痛、半身不遂、癲癇、水腫、跌打損傷。

產　　地：台灣。

編　號：711

金合歡

別　名：鴨皀樹、牛角花、刺毬花
蕃刺仔、羊牯刺

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Acacia farnesiana* willd

英　名：Farnesian Acacia , Black Thorn

生育特徵：多年生落葉灌木，枝上有一對托葉所變成之棘針，長約 2cm 葉為二回羽狀複葉。夏秋間開鮮黃色花，芳香，莢果圓筒狀線形，黑熟，內有多枚種子。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：其皮含兒茶鞣酚 3.45%，花含精油 0.081%，主成分 Methyl-salicyate.Benzyla cohol. Farnesol Linalol Geraniol 等。葉含精油，採割樹幹可得阿拉伯膠。莢果含單寧 23%。

功　效：根解熱，治瘧疾、丹毒。花香水原料。

產　地：熱帶美洲、台灣亦產。

編　號：712

台灣海桐

別　名：台灣七里香、十里香、雞榆、七里香

科　名：海桐科 (Pittosporaceae)

學　名：*Pittosporum pentadrum* (Blanco)Merr.

生育特徵：多年生常綠小喬木，葉互生，成節狀叢生或輪生，革質，卵形至長橢圓形，全緣或微波緣，圓錐花序，頂生，花小，密生，乳白色，具芳香，蒴果球形，熟時黃色或桔黃色，含種子 5-6 粒。花期 3-6 月，果期 6-10 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：皮、根及枝葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：皮治腰腳不便、血脈頑痹、腿膝疼痛、赤白瀉痢、風濕腫毒。根治跌打損傷。枝葉治皮膚病、膚癢。

產　地：菲律賓、西里伯斯及中印度等地、台灣南部及蘭嶼等地亦產。

編　　號：713

胡頹子

別　　名：魏氏胡頹子

科　　名：胡頹子科(Elaeagnaceae)

學　　名：*Elaeagnus wilsonii* Li

生育特徵：多年生常綠半蔓性灌木，枝條多為懸垂狀，短枝直立。葉互生，闊卵形至長橢圓形或長橢圓狀披針形，全緣或波狀緣，上面暗綠色，背面銀白色。花總狀花序，腋生，下垂，具香味，白色或乳白色，果實核果狀，圓形至短橢圓形，熟時紅色至桔紅色。花果期 10-4 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果、葉及根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：果為強壯、收斂。葉治咳嗽、氣喘、痢疾。根治吐血。

產　　地：台灣。

編　　號：714

菊花木

別　　名：龍鬚藤

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Bauhinia championi* Benth.

生育特徵：多年生喬木，莖徑粗達 20cm 時，橫斷面木質部和韌皮部交錯成菊花狀之花紋，葉為單葉，先端深裂或淺裂為 2，心臟形，長 6-8cm，10 月開白色，總狀花序，著生葉枝。先端，莢果扁平，種子扁平黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：卷鬚。

主要成分：生物鹼。

功　　效：卷鬚供藥用，含有毒成分，毒捕魚用。具有殺蟲力。

產　　地：台灣原產、越南、印尼、爪哇、印度及中國大陸。

編　　號：715

胭脂樹

別　　名：紅木、甘密、臙脂樹

科　　名：胭脂樹科(Bixaceae)

學　　名：*Bixa orellana* Linn.

生育特徵：多年生常綠灌木至小喬木，葉互生，卵形，全緣。圓錐花序，頂生，蒴果稍扁卵形或近球形，密生長軟刺。種子紅色。花期春夏。果期夏秋間。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根及根皮、葉、果實、果肉、種子。

主要成分：果含純胭脂樹素(reinbixin)及紅色素。

功　　效：採根及根皮有收斂、利尿、退熱、解毒之效。治熱病、感冒發熱、間歇熱、持續熱、瘧疾、肝炎、尿血。葉有收斂、解毒之效。治黃疸、痢疾、毒蛇咬傷。果實有健胃、驅蟲之效。果肉有解熱、鎮痛、健胃、止血及解木薯、麻瘋樹毒。治胃病、肝病、腎臟病、皮膚病、瘡瘍、傷口癒合。種子有強心、解熱之效。治熱病、淋病。種子油外用治麻瘋病。

產　　地：美洲熱帶地區、台灣亦植，供觀賞或標本性零星種植。

編　　號：716

嘉寶果

別　　名：樹仔葡萄、喬巴的果

科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)

學　　名：*Eugenia cauliflora* L.

英　　名：Jaboticab

生育特徵：多年生小喬木，嫩葉為淺紅色，熟葉為深綠色，葉形為披針至橢圓形，對生，柄短，花白色，單生或簇生在樹幹及枝幹上。果呈圓形或扁圓形，外表堅硬光滑，狀似葡萄，未熟果皮綠色，成熟果為紫色。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插及嫁接等繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：含糖度 13-16%，檸檬酸、草酚、單寧蔗糖、果糖、葡萄糖、礦物質及維他命等。

功　　效：果實可當水果食用及健康食品用。

產　　地：巴西、亞馬遜河流域、台灣自巴西引入(1962 年)。

編　號：717

海檬果

別　名：牛心茄子
科　名：夾竹桃科(Apocynaceae)
學　名：*Cerbera manghas* Linn.
生育特徵：為多年生灌木或小喬木植物，株高 5m，葉互生，葉長橢圓形、披針形。花腋生，白色花，結核果。
繁殖方法：實生法繁殖或分蘖繁殖。
利用部位：種子、樹汁。
主要成分：生物鹼。
功　效：其種子有毒，入外科膏葯，當麻藥用。樹汁催吐下瀉劑。
產　地：中國、台灣亦產。

編　號：718

小辣樹

別　名：小蠟樹、魚蠟、魚蠟樹
冬青、山指甲、水黃楊
亮葉小蠟、水白蠟、指甲花
蚊仔樹、水冬青、土茶葉
科　名：木犀科(Oleaceae)
學　名：*Ligustrum sinense* Lour.
生育特徵：多年生灌木，株高 2m 以上，葉互生，橢圓形或橢圓狀披針形，全緣。花圓錐花序，白色，核果球形，熟黑，花果期 5-10 月。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根有利濕、化痰、止血之效。治小便不利。葉有清熱解毒、降火止咳、消腫止痛、去腐生肌之效。治急性黃疸型肝炎、病毒型肝炎、肺熱咳嗽、口腔炎。外用治創傷感染、燒燙傷、濕疹、皮膚炎、毛囊炎、指頭炎、瘡傷腫毒、跌打損傷。
產　地：中國大陸、台灣亦產。

編　　號：719

降真香

別　　名：降香、紫降香
花梨母、降香檀

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Dalbergia odorifera* T.Chen.

英　　名：Rosewood

生育特徵：多年生喬木，葉為羽狀複葉，互生，卵形或橢圓形，基部小葉較小，闊卵形。花圓錐花序腋生，淡黃色或乳白色。莢果舌狀長橢圓形，長 4.5-8cm，寬 1.5-1.8cm，花期 4-6 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：心材。

主要成分：揮發油。

功　　效：為行氣活血、止痛、止血。用在脘腹疼痛、肝郁?痛、胸痺刺痛、跌打損傷、外傷出血。

產　　地：中國海南、台灣亦植。

編　　號：720

花椒

別　　名：竹葉椒、狗花椒及秦椒

科　　名：芸香科(Rutaceae)

學　　名：*Zanthoxylum planispinum* S.etZ.

生育特徵：多年生常綠木質藤本，老莖具刺瘤，枝及葉總柄軸均具硬皮刺。葉互生，長柄，為奇數羽狀複葉。花繖房狀圓錐花序，腋生。蓇葖果熟紅或紅褐色。種子黑色。花期春夏間，果期夏秋間。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：枝葉、果及根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：秋季採枝葉為芳香性健胃藥。果療喉痺、利五臟。根治蛇傷。

產　　地：中國、台灣、韓國、日本。

編　號：721

喜樹

別　名：旱蓮、水栗子
千張樹、水桐樹
科　名：旱蓮科(Nyssaceae)
學　名：*Camptotheca acuminata* Decaisne
生育特徵：多年生落葉喬木，葉互生，卵形至長橢圓形，全緣或微波緣。花單性同株，多數簇生成頭狀花序。雌花序頂生，雄花序腋生。白色，瘦果似香蕉。長2-2.5cm，花果期6-11月。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全株。
主要成分：採全株，含喜樹鹼(camptothecine)。
功　效：有抗癌，尤其血癌特效，為散結、化瘀、清熱、解毒、殺蟲之效。
產　地：中國、台灣亦植。

編　號：722

厚殼樹

別　名：台灣厚殼樹、恆春厚殼樹
厚殼仔、山檳榔
科　名：紫草科(Boraginaceae)
學　名：*Ehretia resinosa* Hance
生育特徵：多年生灌木至小喬木，葉互生，倒卵狀橢圓形、橢圓形或卵形，全緣或波狀緣。聚繖花序繖房狀，頂生枝端，開白色花，核果球形，熟黃。花果期1-8月。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根及樹皮。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根及樹皮有袪瘀生新、止痛生肌、收斂止瀉之效。治跌打損傷、腫毒、癰瘡、腸炎腹瀉。
產　地：中國廣西、菲律賓、台灣等地。

編　　號：723

雲實

別　　名：紅老鷹刺
科　　名：豆科(Leguminosae)
學　　名：*Caesalpinia decapetala* Alston
生育特徵：多年生灌木或小喬木，羽狀複葉，長橢圓形小葉對生。莖枝均有刺。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：種子、根。
主要成分：生物鹼。
功　　效：種子清熱、去濕、殺菌、殺蟲。根祛風、散寒、除濕、消腫、止痛。治耳痛、筋骨酸痛、腰痛、跌打損傷、痢疾、瘧疾、牙痛、咽喉腫痛。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：724

茄冬樹

別　　名：茄苳、重陽木、秋楓胡楊、紅桐
科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　　名：*Bischofia javanica* Blume
英　　名：Java cedar
生育特徵：多年生落葉喬木，葉為互生，掌狀三出複葉，小葉橢圓形或卵圓形，花單性花，細小淡綠黃瑟，春開花,花為圓錐花序，果球形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：葉、根、皮及果實。
主要成分：含單寧。乾性油。
功　　效：葉為解熱消炎、治肺炎。根為養血滋骨，主補血、胃病、感冒、肺炎及發育不良。皮為風濕性骨關節炎、哮喘。果實為收斂、治膀胱有風、並為強壯劑。
產　　地：中國大陸南部、海南島、亞熱帶地區、台灣、新竹。

編　號：725

麵包樹

別　名：巴刀蘭、羅密樹、麵磅樹
科　名：桑科(Moraceae)
學　名：*Artocarpus altilis* (Park.) Fosberg.
英　名：Bread~fruit-tree.
生育特徵：為多年生常綠喬木，葉互生，卵形，全緣或具 3-9 裂片，花 4-5 月開，雌花雄花同株，柔荑花序，果球形，多刺頭狀。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：葉、葉末及花。
主要成分：果實含糖分，碳水化合物，粗脂肪等。

功　效：葉為治疤疹，葉末治脾腫。花治牙痛。藥用為止痛利尿、腰酸背痛、糖尿病、腎臟炎。
產　地：恆春半島、台灣、新竹。

編　號：726

山刺番荔枝

科　名：番荔枝科(Annonaceae)
學　名：*Annona muricata* L.
英　名：Sowrsop
生育特徵：多年生常綠小喬木，葉長倒卵形至卵狀倒披針形或橢圓形，葉背面鏽色。花大形，腋生，黃色果，卵狀心形，種子黑色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：葉、樹皮、果、種子。
主要成分：葉含番荔枝鹼(anonaine)及anonine二種生物鹼，樹皮含muricine 及 mwricinine 二種生物鹼。種子亦含生物鹼。

功　效：葉止咳，治僂麻質斯。樹皮治強直，果治壞血病，種子收斂。
產　地：西印度、台灣亦種植。

編　號：727

楓香

別　名：楓香樹、楓香脂、楓仔

科　名：金縷梅科(Hamamelidaceae)

學　名：*Liguidambar formosana* Hance.

英　名：Fragrant Maple

生育特徵：多年生落葉大喬木，葉互生，菱形，掌狀分裂3，花單性，圓錐花序，開黃褐色花，蒴果球形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：含樹脂、樹皮酚、單寧及精油等。

功　效：無毒，治風癢浮腫、齒痛、瘡疥、金瘡、吐血、咳血、活血、生肌、解毒、止痛。香脂燒過揩牙，永無牙疾。

產　地：中國、日本、台灣、新竹。

編　號：728

台灣欒樹

別　名：欒樹、木欒樹、木欒華、苦楝舅

科　名：無患子科(Sapindaceae)

學　名：*Koelreuteria formosana* Hoyata

生育特徵：落葉喬木，葉為羽狀複葉，亦有二回羽狀複葉，小葉卵形或卵狀橢圓形，7-15枚，邊緣重鋸齒，小而銳，葉基部歪形。夏季，枝端抽闊大圓錐花叢，長約35cm，開多數黃綠色小花。蒴果長橢圓狀卵形，種子球形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：花。

主要成分：含樹膠，花含黃色素。

功　效：6-7月採花，花氣味苦、寒、無毒。主治目痛淚出、傷眥、消目腫。

產　地：台灣、新竹。

鷹爪藤

編　　號：729

別　　名：鷹爪、鶯爪

科　　名：番荔枝科(Annonaceae)

學　　名：*Artabotrys hexapetalus* (L. F.) Bhandari

生育特徵：攀援灌木，無毛，高3-4m，葉矩圓形或寬披針形，長6-16cm，寬 2.5-6cm，先端漸尖或急尖，基部楔形。花1-2朵生在木質狀總花梗上，淡綠色或淡黃色，芳香。果卵形。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：花、果實。

主要成分：含精油。

功　　效：其花可提取香精油，亦供薰茶用。果實搗爛貼患處，可治頭頸部淋巴結核。

產　　地：中國、印度及菲律賓。台灣亦栽植。

左手香(木本)

編　　號：730

別　　名：到手香

科　　名：脣形科(Labiatae)

學　　名：*Pogostemon cablin*

英　　名：Patchouli

生育特徵：灌木或小喬木，莖直立，回稜形，葉卵形，有芳香。葉緣具重鋸齒。花穗上輪生白色花。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：葉。

主要成分：含精油。

功　　效：利用葉，為殺菌、興奮、驅蟲等。亦治頭疼、腸胃氣帳、嘔吐、腹瀉和發燒。含精油為香料固定劑。並為治粉刺、濕疹、香港腳和皮膚乾裂。

產　　地：印度、中國、台灣、新竹。

編　　號：731

黃金桂

別　　名：凹頭蕒芝、大丁癀
　　　　　刺格、台灣拓樹
科　　名：桑科(Moraceae)
學　　名：*Cudrania Cochinchinensis* (Lour) Kudo et Masam
生育特徵：小灌木，葉長披針形至橢圓形，葉尖鈍或凹。葉互生，花呈黃色，聚合花序。聚合果，橙黃色，多汁可食。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根及莖。
主要成分：材中含黃色素。根含黃酮苷、酚類、氨機酸、有機酸及醣類。
功　　效：為治跌打撲傷。其根及莖為解熱、解毒藥、並治風濕病。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：732

黃連木

別　　名：爛心木、黃練樹
　　　　　黃練芽
科　　名：漆樹科(Anacardiaceae)
學　　名：*Pistacia chinensis* Bge
生育特徵：小喬木，葉互生，葉為奇數羽狀複葉，小葉呈長披針形，葉尖銳，葉柄及莖呈暗(晚)紫色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：為治痢疾。
產　　地：台灣、新竹。

光果翼核木

編　號：733
別　名：青皮貓、青皮虎
血風藤
科　名：鼠李科(Rhamnaceae)
學　名：*Ventilago elegans* Hemsl
生育特徵：小喬木，葉卵形至卵狀橢圓形，開白花。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根、莖。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根、莖治消腫、固肺、消中氣。治肺炎、肺病、疝氣、風濕。
產　地：台灣、新竹。

接骨木

編　號：734
別　名：紅果金粟蘭、接骨金粟蘭
草珊瑚、九節茶
科　名：金粟蘭科(Chloranthaceae)
學　名：*Sarcandra glabra* (Thunb) Nakai
生育特徵：常綠小灌木，光滑無毛，莖單生或叢生，節膨大成膝狀。葉對生短柄。橢圓形至卵狀披針行，葉緣鋸齒，葉先端銳。枝頂開綠黃色小花，芳香，為穗狀花序，結球形小果，熟紅色。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：利用根、莖、葉。辛、平，為消炎、祛風除濕、活血止痛。治肺炎、急性蘭尾炎、菌痢、風濕疼痛、跌打損傷、骨折。
產　地：台灣、新竹。

編　　號：735

破布子

別　　名：樹子仔、青桐翠木

科　　名：紫草科(Boraginaceae)

學　　名：*Cordia dichotoma* Forst f

生育特徵：落葉或半落葉喬木，葉互生，具葉柄，卵形或圓形，全緣波狀，葉尖鈍。春夏開花，腋生，花冠黃白色，果褐黃色，球形褐果。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：根及果實。

主要成分：生物鹼。

功　　效：利用根及果實，其味苦為澀，性平或微涼。為治腸痢瀉下、心胃氣痛、祛痰鎮咳、糖尿病、胃病及頸椎骨刺、子宮炎、子宮脫出。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：736

巴西乳香

別　　名：乳香、乳香樹

科　　名：漆樹科(Anacardiaceae)

學　　名：*Pistacia terebinthus*

生育特徵：芳香常綠灌木，葉互生，為羽狀複葉，小葉長披針形至長橢圓形。結果由紅轉黑色漿果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：樹皮。

主要成分：樹脂。

功　　效：樹皮產乳香。由樹皮流出之樹脂為用作香水之基本原料。可做清香劑咀嚼，並為祛痰劑。

產　　地：巴西、台灣、新竹。

蜂蜜桉

編　　號：737
科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)
學　　名：*Eucalyptus melliodora*
生育特徵：常綠喬木，葉色較深，枝葉有蜂蜜芳香。葉互生，長披針形至長橢圓形，葉尖銳。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：葉。
主要成分：精油。
功　　效：可作為香料、醫療藥品、驅蟲劑原料。其葉可製精油，可驅蟲、肥皂清潔劑等原料及庭園景觀植物。
產　　地：原產澳洲、台灣、新竹。

七日暈

編　　號：738
別　　名：紅珠仔、山漆莖
紅心宰、大本紅雞母珠
紅意仔
科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　　名：*Breynia officinalis* Hemsl
生育特徵：半落葉灌木，葉互生，羽狀複葉，小葉長橢圓形或近卵形，全緣。花腋生，果為成熟時紅色。漿果球形。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根、莖及葉。
主要成分：生物鹼。

功　　效：利用根、莖及葉。有劇毒、麻醉性、破血行氣。治花柳病、癰疽、腫毒、梅毒、內腰、便毒、跌打散瘀、瘰癧、痲瘋、乳癌。經久煮即解毒。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：739

台灣山桂花

別　　名：鯽魚膽、杜桓山山桂花、杜莖山

科　　名：紫金牛科（Myrsinaceae）

學　　名：*Maesa tenera* Meg

生育特徵：灌木或小喬木，葉互生，橢圓形或長橢圓形，葉緣具鋸齒。花白色，腋生，複總狀花序，果實球形。熟時白色。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：莖、葉。

主要成分：果皮含杜莖山醌(Maesaquinone)。

功　　效：利用莖、葉。為治溫瘴寒熱、煩渴、心躁頭痛、解熱、止血、切傷、有消腫毒。亦可治感冒、頭痛、眩暈、水腫、腰痛。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：740

指甲花

別　　名：散沫花

科　　名：千屈菜科(Lythraceae)

學　　名：*Lawsonia inermis* L.

生育特徵：灌木或小喬木，葉對生，披針形至長橢圓形，葉緣光滑，葉尖鈍。花為穗狀花序，白色。果實熟為褐色。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：葉、樹皮及果實。

主要成分：含香精油。

功　　效：利用葉作紅色染料，可染身體、頭髮、指甲、布料。清涼且具收斂性，可治發燒、頭痛、刺傷、關節痛、皮膚炎。又可治除臭。樹皮及果實亦可藥用，從花中亦提取香水。

產　　地：北非及西南亞、台灣、新竹。

編　號：741

神秘果

別　名：變味果
科　名：山欖科(Sapotaceae)
學　名：*Synsopalum pouteria* Dulcifica Bach.
生育特徵：多年生常綠灌木，葉互生，葉呈倒橢圓形，全緣，光滑，果漿果，熟時紅色。
繁殖方法：實生法繁殖或高壓條繁殖。
利用部位：果肉。
主要成分：其成分為 Miraculin。
功　效：果肉甘可食，由酸味變甘味，可利用果實，將酸變甜味，以適合大部分人食用。可改變口部味覺。
產　地：台灣、新竹。

編　號：742

日本女真

別　名：女真、女真木、冬青木冬青樹、毛女真
科　名：木犀科(Oleaceae)
學　名：*Ligustrum japonicum* Thunb
生育特徵：常綠灌木，葉對生，呈卵形或卵狀橢圓形，全綠。長 5-7cm，寬 2.5-4.5cm。花圓錐花序。芳香，白色。果實卵形或橢圓形，熟時紫黑色。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：果實。
主要成分：葉含 Syringin phloinolsaure phillyrin。果實含 anthocyane 色素。
功　效：採果實乾燥稱女真子。為強壯補精劑。日本以葉搗敷腫毒。
產　地：台灣、新竹。

編　號：743

雲南黃馨

別　　名：黃素馨、雲南黃素馨
陽春柳、迎春柳
金梅花、迎春花

科　　名：木犀科(Oleaceae)

學　　名：*Jasminum mesnyi* Hance

生育特徵：常綠攀援狀灌木。葉對生，3出複葉，頂生小葉較大，長卵狀披針形或長披針形，兩側小葉較小，卵形，倒卵形或卵狀披針形，全緣。花單生葉腋，花冠黃色。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：葉含生物鹼、素馨苦苷(jasminin)。

功　　效：全草清熱、解毒、消腫、殺蟲、抗炎、抗菌、抗癌之效。治牙痛、腮腺炎。花稱馬英花為包種茶之香料。具止下歷、腹痛之效。治腫毒、惡瘡。花含精油。

產　　地：雲南等地、台灣、新竹。

編　號：744

欖仁樹

別　　名：枇杷樹、古巴梯斯樹
雨傘樹

科　　名：使君子科(Combretaceae)

學　　名：*Terminalia catappa* Linn

生育特徵：落葉大喬木。葉倒卵形，全緣。秋落葉前轉變為紅色。雌雄同株。穗狀花序腋出，白色。核果扁橢圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉或樹皮。

主要成分：生物鹼。

功　　效：利用葉或樹皮，樹皮止痢、治腫毒。葉治皮膚病、肝病、肺病、中氣不暢。

產　　地：古巴、台灣栽培已本土化、新竹。

編　號：745

羅漢果

科　名：葫蘆科(Cucurbitaceae)

學　名：*Momordica grosvenori* Swingle

生育特徵：多年生草質藤本，長 2-5m。莖蔓暗紫色，葉互生，心狀卵形，先端急尖或漸尖，基部耳狀心形，全緣。面被均有白色柔毛。花雌雄異株，總狀花序，橙黃色。瓜果圓形或長圓形，種子淡黃色。花期 6-8 月，果期 8-10 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：含羅漢果苷(esgoside)較蔗糖甜 300 倍。另含果糖、氨基酸、黃酮等。

功　效：秋季果實轉深綠時採收，低溫乾燥。味甜。性涼、為清熱潤肺、滑腸通便。用於肺火燥咳、咽痛失言、腸燥便秘。

產　地：中國、廣西、江西、廣東及台灣、新竹。

編　號：746

珊瑚樹

別　名：著生珊瑚樹、沙掌樹
高櫨樹、香柄樹、楓飯樹
痲油香、山豬肉

科　名：忍冬科(Caprifoliaceae)

學　名：*Viburnum odoratissimum* Ker

生育特徵：常綠灌木或小喬木，葉片較小、厚，葉緣平滑，分枝多，葉長倒卵形或橢圓形。全緣或疏齒緣。花白色，花期 3-5 月。果為核果，橢圓形，果熟紅色至轉黑色。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：果實。

主要成分：生物鹼。

功　效：治風濕疼痛、跌打損傷、骨折、感冒發熱創傷、腫毒。

產　地：中國南部、日、印、緬、菲及台灣、新竹。

印度紫檀

編　　號：747
科　　名：豆科(Leguminosae)
學　　名：*Pterocarpus indicus* Willd
生育特徵：喬木，葉羽狀複葉，互生，小葉卵形或橢圓形。總狀花序，花黃色。莢果圓形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、根皮、樹皮及葉。
主要成分：心材有芳香，其抽出物中有葡萄糖、單寧、戊糖。灰分，紫檀酸(Santalic acid)或紫檀貼(Santalin)。
功　　效：採取根、根皮、樹皮及葉等為藥用。亦為芳香劑。木材治發燒、痢疾、利尿。樹皮為腸胃藥。亦可治齒痛、腹瀉、白帶、出血等。
產　　地：印度、馬來等、台灣、新竹。

樹蔘

編　　號：748
科　　名：五加科(Araliaceae)
學　　名：*Dendropanax dentigerus* (Harms) merr
生育特徵：灌木或小喬木。葉互生，橢圓形，全緣。繖形花序，頂生，淡綠色，果橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根、莖、葉治風濕、舒筋活絡。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：749

金雞納

別　名：棕色金雞納樹
小葉金雞納樹(台灣稱)
正金雞納樹、藥用金雞納樹
金雞納。
科　名：茜草科(Rubiaceae)
學　名：*Cinchona officinalis* Linn
生育特徵：常綠小喬木，葉對生。葉片卵狀披針形至披針形。先端鈍形或尖形，全緣。花為小聚繖花序。開白色花，蒴果長卵狀長橢圓形，種子小橢圓形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：皮。
主要成分：含生物鹼、奎寧等成分。
功　效：皮有解熱、鎮痛、抗瘧、解酒之效。
產　地：祕魯、印度等地、台灣、新竹。

編　號：750

樟樹

別　名：樟、芳樟、樟仔、樟腦仔
科　名：樟科(Lauraceae)
學　名：*Cinnamomum camphora* (L.) Nees & Eberm
生育特徵：常綠大喬木，具芳香，葉互生，卵形或橢圓形，葉尖銳，全緣。花腋生，乳黃色。漿果球形，熟紫黑色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全株。
主要成分：含樟腦油、芳香油。
功　效：為興奮、強心、防蟲。驅風、止痛、感冒。
產　地：台灣、大陸、日本等地、台灣、新竹。

編　號：751

沉香

別　名：蜜香、沉水香
蜜香樹、速香
奇南香木、沉香樹。

科　名：瑞香科(Thymelaeaceae)

學　名：*Aquilaria agallocha* Roxb

生育特徵：常綠喬木，葉互生，橢圓披針形、披針形或倒披針形。先端漸尖，全緣。繖形花序，花白色。蒴果倒卵形，種子通常一粒，卵圓形，基部有角狀附屬物，長約種子兩倍。花期3-4月，果期5-6月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：含精油及其他沉香醇等。

功　效：降氣溫中、暖腎納氣。治氣逆喘息、嘔吐呃逆、脘腹帳痛、腰膝虛冷、大腸虛秘、小便氣淋、精冷。

產　地：分布廣東、廣西、印度、印尼、越南、馬來西亞、台灣、新竹。

編　號：752

海桐

別　名：海桐花、七里香

科　名：海桐科(Pittosporaceae)

學　名：*Pittosporum tobira* Ait

生育特徵：常綠大灌木或小喬木，葉互生，倒卵形或長橢圓形。葉尖圓形或鈍形，全緣。花總狀花序，頂生，白色後變黃色。果為蒴果。花期3-5月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：皮及葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採皮及葉入藥。治跌打、風濕、皮膚癢。

產　地：中國、韓國、日本及台灣、新竹。

編　號：753

蘭嶼山馬茶

別　名：蘭嶼馬蹄花

科　名：夾竹桃科(Apocynaceae)

學　名：*Tabernaemotana subglobosa* Merrill

生育特徵：常綠灌木，葉對生，葉片橢圓形至長橢圓形，基部鈍形或尖形，先端鈍形或近圓形，全緣。兩面光滑無毛。聚繖花序繖房狀，頂生。生於近海之海岸灌叢中。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：根、粗莖。

主要成分：生物鹼。

功　效：利用根、粗莖有清熱解毒、消腫、降血壓、殺蟲之效。全株具小毒，至乳腺炎、風濕病、肌肉疼痛、高血壓。葉外敷癰瘡腫毒。其乳汁外敷治酸痛。

產　地：蘭嶼、台灣、新竹。

編　號：754

鐵刀木

別　名：鐵樹、黑心樹

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Cassia siamea* Lamark

生育特徵：常綠喬木，具穗般深紅色幼葉，冬天開到春天，具金色雄蕊大而芳香的白花。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：雄花、芽、種子、葉和花及花蕾。

主要成分：生物鹼。

功　效：其雄花可治療發燒，芽治痢疾，且為收斂劑、咳嗽。種子治濕疹和風濕病。葉和花可治某些蛇咬。花蕾用於香料和化妝品。

產　地：中國、馬來西亞、台灣、新竹。

編　號：755

藤紫丹

別　名：拍拍藤、倒爬麒麟
冷飯藤、清飯藤
科　名：紫草科(Boraginaceae)
學　名：*Tournefortia sarmentosa* Lamarck
生育特徵：多年生木質藤本，單葉互生，葉片橢圓形或卵狀橢圓形。聚繖花序，頂生，花小綠白色。果球形熟時白色。花果期秋、冬間。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：利用根、莖、葉為祛風、除濕、解毒、消腫。
產　地：台灣、新竹。

編　號：756

尤加利

別　名：大葉桉、有加利
大葉有加利、桉樹
蚊仔樹。
科　名：桃金孃科(Myrtaceae)
學　名：*Eucalyptus robusta* Smith
英　名：Beakpod eucalyptus. Browm gum. Swamp mahogany.
生育特徵：常綠大喬木，單葉，互生，長卵狀或長橢圓狀披針形，全緣。花為繖形花序，腋生或側生。果為蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：枝、葉及根。
主要成分：生物鹼。
功　效：枝、葉及根供藥用。葉有清熱解毒之效。治感冒、急性腸炎、痢疾、腎盂炎、糖尿病、丹毒、萎縮性鼻炎、化膿性角膜炎、癰腫、下肢潰瘍創傷感染、燙傷、膚癢。根治糖尿病、風濕痛、神經痛。
產　地：澳洲、台灣、新竹。

二葉松

編　　號：757

別　　名：松柏、新高赤松
台灣二葉松、松羅
松樹、台灣赤松
玉山赤松。

科　　名：松科(Pinaceae)

學　　名：*Pinus taiwanensis* Hayata

生育特徵：常綠大喬木。樹幹通直，樹皮灰褐色，龜裂鱗片狀剝落。葉針形，花單性同株異花。結球果，毬果長橢圓狀卵形。種子茶褐色，翅鐮刀形。花期春季，果期秋季。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：為利尿、強壯、治健忘。並可製藥酒。

產　　地：台灣、新竹。

板栗

編　　號：758

別　　名：台灣栗

科　　名：殼斗科(Fagaceae)

學　　名：*Castanea mollissima* Blume

英　　名：Taiwan chestnut

生育特徵：落葉喬木，高達 20m，單葉互生、橢圓形，葉緣呈刺鋸齒緣。花為葇荑花序。堅果、果臍小。花期 3-4 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果。

主要成分：其果及皮含槲皮素(quercetin)即抗生素。

功　　效：堅果供食用。採果益氣、厚腸胃、補腎氣。果殼治痰火、瘰癧、消渴、反胃、瀉血。

產　　地：中國、韓國、印度、錫蘭以及台灣、新竹。

編　　號：759

澳洲胡桃

別　　名：昆士蘭山龍眼

科　　名：山龍眼科(Proteaceae)

學　　名：*Macadamia integrifolia* F. Muell

英　　名：Australian Nut

生育特徵：常綠小喬木，葉滑澤，3-4 輪生，長圓披針形，頭銳或鈍。全緣或疏齒。花白色，果球形。3-4 月開花，9-10 月果熟。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：堅果、種子。

主要成分：葉含氰酸配糖體。果殼含單寧 4%。種仁含脂肪 66.7%。

功　　效：堅果可使皮膚柔軟，種子油可作醫藥用皂。

產　　地：澳洲、台灣、新竹。

編　　號：760

牛奶榕

別　　名：天仙果、牛乳榕、鹿飯三麴、乳漿仔、大丁黃牛母乳、毛天仙果、山牛奶牛奶珠、牛乳埔、牛乳婆。

科　　名：桑科(Moraceae)

學　　名：*Ficus erecta Thunb* var *beecheyana* (Hook et Arn)King

生育特徵：半落葉性小喬木，全株被有毛茸。葉互生，倒卵形或長橢圓形，全緣。隱花果，腋出，單生，呈球形或梨形，熟時紅紫色，可食用。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、枝葉、果實。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根，味甘、辛、性溫，有益氣健脾、火血通絡、祛風除濕、消腫解毒之效。治勞倦乏力、四肢痠軟、氣血虛弱、筋骨痠痛、腎虛腰痛、風濕病、風濕關節炎、食慾不振、乳汁不下、脾虛白帶、脫肛、月經不調、頭痛、跌打損傷。枝葉有補中益氣、強筋壯骨、健脾化濕、活血去瘀、消腫解毒之效。果實有潤腸通便、緩下、解毒消腫之效。治便秘、痔瘡腫痛。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：761

橡牙樹

別　名：黑檀、象牙樹、烏皮石柃
科　名：柿樹科(Ebenaceae)
學　名：*Diaspyros ferrea* (Willdenow) Bakhuizen
英　名：Philippine ebony ersimmon
生育特徵：常綠喬木，皮黑褐色。單葉，互生，倒卵形，葉尖鈍，全緣。單性花，雌雄同株。黃白色。果為漿果，橢圓形，被毛，熟時暗紅色或黑色。花期3-4月。材質堅重，比重大於水，亦稱陰沉木。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：木材。
主要成分：生物鹼。
功　效：具有抑制癌細胞生長，為抗癌藥。
產　地：印度、琉球、菲律賓、馬來西亞等地、台灣、新竹。

編　號：762

蘭嶼羅漢松

科　名：羅漢松科(Podocarpaceae)
學　名：*Podocarpus cotalis* Presl
英　名：Lanyu podocarp
生育特徵：常綠灌木或小喬木，單葉，線形或線狀披針形，葉尖圓形或鈍形。單性花，雌雄異株。核果狀，熟時深黑色。花期3-5月。為台灣稀有之海岸植物。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根皮、葉、種子及花托。
主要成分：生物鹼。
功　效：根皮有活血、祛瘀之效。治跌打損傷。葉味淡、性平。治咳血、吐血。種子及花托稱羅漢松實。味甘、性微溫。有溫中行氣之效。治胃痛。
產　地：蘭嶼、台灣、新竹。

編　　號：763

毛柿

科　　名：柿樹科(Ebenaceae)

學　　名：*Diospyros philippensis* (Desr)Gurke

英　　名：Mabolo Taiwanebony Velvetapple

生育特徵：常綠喬木。葉革質，披針形，互生。葉尖銳，單性花，腋生黃白色。果扁球形，熟時紅色，密被長絨毛。花期 3-4 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果。

主要成分：生物鹼。

功　　效：果可食。枝葉有毒。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：764

台灣火刺木

別　　名：台東火刺木

科　　名：薔薇科(Rosaceae)

學　　名：*Pyracantha koidzumii* (Hayata)Rehder

英　　名：Taiman firethorn

生育特徵：常綠灌木，小枝先端常延長為刺。葉 3-5 枚叢生，倒卵狀長橢圓形，葉尖微凹具芒刺，全緣。花聚繖花序，頂生，被毛。果為核果，球形，熟時呈紅色。台灣原有植物。花期 3-4 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果。

主要成分：生物鹼。

功　　效：果健脾消積、活血止血。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：765

桃實百日青

別　　名：桃實、百日青、土杉
山鄉思、埔里百日青
桃板松、脈葉羅漢松、瓔珞松

科　　名：羅漢松科(Podocarpaceae)

學　　名：*Podocarpus macroophyllus* (Thunb) D Don var *nakaii* (Hayata) Li & Keng

英　　名：Nakai podocarp

生育特徵：常綠中或大喬木，單葉互生，披針形或線狀披針形，葉尖鈍形，全緣或呈波狀緣，花腋生，單生，種子斜卵圓形。台灣固有植物，花期 3-5 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉、枝。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採葉、枝有祛風、活血、止痛接骨之效。治風濕病、癨痧、骨折。採葉治支氣管炎、關節炎。

產　　地：蘭嶼及中、北部、新竹。

編　　號：766

繖楊

別　　名：恒春黃槿、截萼黃槿
楊葉肖槿、肖槿。

科　　名：錦葵科(Malvaceae)

學　　名：*Thespesia populnea* (Linn) Soland et Correa

生育特徵：為灌木或小喬木，葉三角狀卵形，先端長漸尖，全緣，光滑。花單生腋出，黃色。蒴果梨形或壓扁形，熟時黑褐色，宿存萼。花期 7-8 月，果期 12-1 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉、皮、木材。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根、葉有消炎、止痛之效。治腦膜炎、痢疾、疝痛、痔瘡、疥癬。皮、木材有收斂之效。治胸膜炎、霍亂、赤痢、痔瘡。皮、葉治膚瘡、關節炎。

產　　地：台灣南部沿海一帶、新竹。

台東火刺木

編　號：767

別　名：狀元紅、赤陽子
台灣火刺木。

科　名：薔薇科(Rosaceae)

學　名：*Pyracantha koidzumii* (Hayata) Rehder

生育特徵：為灌木或小喬木，葉互生，長橢圓形或倒長橢圓形，全緣。果為蒴果，卵形，熟時橙黃色，很美觀。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：果。

主要成分：生物鹼。

功　效：果實健脾消積、活血止血。治痞塊、食積、泄瀉、痢疾、崩漏、產後血瘀、經閉、筋骨疼痛、血崩、白帶。

產　地：台東、南投、新竹。

鐵雨傘(雨傘仔)

編　號：768

別　名：雨傘仔

科　名：紫金牛科(Myrsinaceae)

學　名：*Ardisia comudentata* Meg

生育特徵：為灌木或小喬木，葉呈披針形，互生，葉緣有鋸齒，齒上有腺點。花白色，果熟時呈紅色，漿果，球形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果

主要成分：生物鹼。

功　效：為治風濕麻痺、跌打、花柳病。

產　地：台灣、新竹。

編　號：769

小梗黃肉楠

別　名：小梗木薑子、台灣黃肉楠
黃肉樹、鐵屎楠、黃肉楠

科　名：樟科(Lauraceae)

學　名：*Litsea hypophaea* Hayata

生育特徵：多年生喬木，樹皮銹褐色。葉互生，葉片倒卵形至倒卵狀披針形，基部楔形或銳尖形，先端鈍形，全緣，葉緣反卷，葉背脈肋上具毛。漿果長橢圓形，熟黃，內含種子 1 粒，卵形，褐色。花期 10-11 月，果期 12-5 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　效：根有行氣止痛、清熱解毒、芳香健胃之效。治心氣痛、脘腹脹痛、痔瘡、腳癬、癰瘡腫毒、燙火傷、跌打損傷。

產　地：台灣、新竹。

編　號：770

楓港柿

科　名：柿樹科(Ebenaceae)

學　名：*Diospyros vaccinioides* Lindl

生育特徵：為多年生灌木或小喬木，葉橢圓形至略圓形，葉緣有鋸齒，葉尖銳，互生，聚繖花序，萼片及花冠均披有短毛。果卵形，平滑，黑熟。

繁殖方法：實生法繁殖

利用部位：柿蒂、果

主要成分：生物鹼。

功　效：柿蒂治呃逆及尿崩症。果開胃消炎、止渴潤心肺、高血壓、下痢、腹瀉。

產　地：台灣恆春半島及華南、新竹。

編　號：771

烏皮九芎

別　名：奮起湖野茉莉、烏雞母白樹、葉下白。

科　名：安息香科(Styracaceae)

學　名：*Styrax formosana* Matsum

生育特徵：灌木或小喬木，葉呈橢圓形，全緣。聚繖花序，開白花，種子為蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　效：為祛痰用。

產　地：嘉義奮起湖、新竹。

編　號：772

野生鳥梨(台灣野梨)

別　名：鳥梨

科　名：薔薇科(Rosaceae)

學　名：*Pyrus kawakamii* Hay

生育特徵：中喬木，落葉性，葉小，呈倒心臟形，葉緣呈細鋸齒至鈍鋸齒，枝上有刺。果實頗小，呈球形或扁球形，外皮銅褐色，有銹色果點。果實 10-12 月成熟，種子扁平，呈尖卵形，黑褐色。種子經 4-6 週冷藏，發芽率可提高。播種期 12-1 月間，播後 2 週即發芽。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：果、皮。

主要成分：樹皮含 Friederin。

功　效：其果、皮均入藥，果實解熱、止咳。

產　地：台灣、新竹。

編　號：773

無患子

別　名：黃目子、肥珠子
肥皂樹、鬼見愁、菩提子
木患子、油珠子、目浪樹
科　名：無患子科(Sapindaceae)
學　名：*Sapindus mukorossi* Gaertner
英　名：Taiwan chestnut
生育特徵：喬木，葉為羽狀複葉，互生，小葉卵狀披針形，全緣。穗狀花序，結漿果，圓形，熟時黃色，種子圓形黑色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果。
主要成分：含皂素。
功　效：飽滿果肉中含皂素，去污力強。治小兒五疳、眼疾、癲癇、祛痰止咳、散瘀。
產　地：台灣、新竹。

編　號：774

台灣櫸木

別　名：台灣櫸、先葉櫸
雞母數、雞油樹、櫸榆
科　名：榆科(Ulmaceae)
學　名：*Zelkova serrata* (Thunb) Makino
英　名：Taiwan zelkova
生育特徵：多年生落葉大喬木。單葉互生，具葉柄，卵形或橢圓狀卵形，葉尖漸尖，葉緣鋸齒，表面粗糙。花單性或雜性，淡黃色，花被杯形。果為瘦果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：皮、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：皮有清熱、解毒、利水、安胎之效。治感冒頭痛、急性結膜炎、胃腸實熱、痢疾、腹瀉、血痢、全身水腫、妊娠腹痛。葉有清涼解毒之效。治癰瘡腫毒、腫爛惡瘡、疔瘡、火爛瘡。
產　地：中國、韓國、日本及台灣產在 1000-2500m 闊葉林內，喜生溪旁，山峰稜線或岩壁上。

編　　號：775

疏脈赤楠

別　　名：島赤楠

科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)

學　　名：*Syzygium paucivenium* (Robins)Merr

英　　名：Lutao eugenia

生育特徵：多年生小喬木，分枝密，圓柱形，單葉對生，葉長 4-5cm，葉寬 2-3cm，倒卵形至橢圓形，葉尖圓形或鈍形，葉緣反捲，脈疏。花為聚繖花序，頂生，分枝對生，果為橢圓形或倒卵圓形。花期 3-5 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：皮。

主要成分：生物鹼。

功　　效：皮有清熱解毒。

產　　地：菲律賓北部、台灣蘭嶼及綠島。

編　　號：776

三葉埔姜

別　　名：埔姜仔

科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　　名：*Buddleia asiatica* Lowr

生育特徵：多年生落葉灌木或小喬木，葉呈長橢圓形至披針形，有葉柄呈三小葉，對生，開紫花，穗狀花序，頂生，蒴果橢圓形，種子細小。

繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。

利用部位：種子。

主要成分：生物鹼。

功　　效：治風濕、瘡腫、牙痛、感冒傷風。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：777

黃槿

別　名：粿葉樹、棕葉仔、粿葉
鹽仔面頭果、面頭果
朴仔、萬年春、榊花
黃木槿、木麻、海麻桐
桐花、公背樹、弓背樹
海羅樹、海麻。
科　名：錦葵科(Malvaceae)
學　名：*Hibiscus tiliaceus* Linn
生育特徵：多年生小喬木，葉互生，葉呈橢圓形至圓形，葉尖銳，全緣或有小鋸齒，花黃色，蒴果球形。花期 6-9 月，果期 9-10 月。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根、樹皮及葉、花。
主要成分：生物鹼。
功　效：根、樹皮及葉有清熱、解毒、鎮咳、散瘀、消腫止血、催吐之效。花治眼疾、耳痛。
產　地：台灣、新竹。

編　號：778

小實女真

別　名：小蠟樹、水冬青
亮葉小蠟、魚蠟樹、水白蠟
蚊仔樹、土茶葉、水黃楊
科　名：木犀科(Oleaceae)
學　名：*Ligustrum sinense* Lour
生育特徵：多年生小灌木，葉長橢圓形至卵形，對生，全緣。圓錐花序，頂生，淺黃色，核果球形，熟黑。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：根有利濕、化瘀、止血之效。治小便不利。葉有清熱解毒、降火止咳、消腫止痛、去腐生肌之效。治急性黃疸型肝炎、病毒性肝炎、肺熱咳嗽、口腔炎。外用治瘡傷感染、燒燙傷、濕疹、皮膚炎、毛囊炎、指頭炎、瘡瘍腫毒、跌打損傷。
產　地：台灣、新竹。

編　　號：779

台灣紅檜

別　　名：紅檜、水古杉、松梧
　　　　　松蘿、薄皮仔

科　　名：柏科(Cupressaceae)
學　　名：*Chamaecyparis formosensis* Matsumura
生育特徵：多年生常綠大喬木，最高可達65m，葉覆瓦狀交互對生，鱗片狀三角形，葉尖銳形至漸尖形。單性花，雌雄同株，雄花序卵形或近球形。毬果橢圓形，種子橢圓形。花期春、夏間，果期秋、冬間。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：枝葉、毬果。
主要成分：含精油。
功　　效：枝葉有祛風、清熱、利尿、抗菌、抗炎、平喘之效。毬果有祛風、安神之效。治感冒、頭痛、胃痛、煩躁。精油有消炎、抗菌之效。治泌尿系統傳染染疾、尿道炎。外用治膚癢。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：780

無花果

別　　名：映日果、文仙果
　　　　　蜜果、天生子。

科　　名：桑科(Moraceae)
學　　名：*Ficus carica* Linn
生育特徵：多年生小喬木，小枝粗，嫩枝被短毛。葉互生，葉片倒卵形或近圓形，基部心臟形，先端鈍，具不規則鋸齒緣或波緣，掌狀葉脈。隱頭花序，花單性同株。瘦果三棱狀卵形，胚彎曲，胚乳豐富。花期夏季，果熟期秋季。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：根、葉、果。
主要成分：生物鹼。
功　　效：根治筋骨疼痛、痔瘡、瘰癧、火病。葉治心痛、溼熱、腫毒、痔瘡。果有健胃、潤腸、止瀉、解熱、祛痰、益肺、理氣、通乳、解毒、消腫、去疣。治咽喉痛、胸悶、食慾不振、消化不良、腸炎、痢疾、便秘、咳嗽痰多、痔瘡、魚口便毒、癰疽、疥癬、腫毒。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：781

紫梅

別　名：梅
科　名：薔薇科(Rosaceae)
學　名：*Prunus mume* (Sieb) et Zucc var. *formosana*
生育特徵：多年生落葉小喬木，單生，互生。葉卵形、倒卵形、闊橢圓形。開白色花或淡紅色花，結核果，花期 1-2 月。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、根、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：果為解渴、助消化，根、葉為消炎、清涼用。
產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：782

油杉

別　名：牛尾杉、台灣油杉桂香、鐵杉、鐵堅杉。
科　名：松科(Pinaceae)
學　名：*Keteleeria davidiana* (Franch) Beissner var. *formosana* Hayata
生育特徵：多年生常綠大喬木，小枝輪生，展開。單葉，螺旋狀著生而扭成二列，線形。單性花，簇生，毬果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：木材。
主要成分：生物鹼。
功　效：有提神醒腦之功效。
產　地：中國、台灣。

編　號：783

油甘

別　名：油柑
科　名：大戟科
(Euphorbiaceae)
學　名：*Phyllanthus emblica* Linn

生育特徵：多年生落葉性喬木，葉互生，似羽狀複葉，葉呈線狀矩圓形。花自葉腋出，淡黃色花，果肉質，球形，熟時赤紅色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、根、皮、葉。
主要成分：含維生素，鞣質、蛇麻指醇。
功　效：有清熱、解毒之效。皮有殺菌去腐之效。
產　地：中國、印度、台灣、新竹。

編　號：784

粗糠柴

別　名：菲律賓粗糠柴
科　名：大戟科 (Euphorbiaceae)
學　名：*Mallotus philippineusis* (Lam) Muell Arg

生育特徵：多年生小喬木，葉互生。葉呈卵形、卵狀披針形。花單性，穗狀花序，頂生或腋生，具紅色腺點，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖或扦插繁殖。
利用部位：果、根、樹皮、葉。
主要成分：含蛋白質、脂肪、纖維素、苷類、鞣質。
功　效：有驅除蟲、抗疱疹之效。
產　地：中國、印度、台灣。

編　號：785

沉香

科　名：瑞香科(Thymelaeaceae)
學　名：*Aquilaria crassna*
生育特徵：多年生常綠喬木植物，葉互生，長橢圓形，自葉腋開白花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：含有樹脂的木材。
主要成分：含揮發油、萜烯醇類丙酮類、樹脂。
功　效：為行氣止痛，治胸腹脹痛，降逆調中，脘痛嘔吐，溫腎納氣，製高級香水及防腐劑。
產　地：泰國、越南、台灣。

編　號：786

恆春山枇杷

別　名：山枇杷、台灣山枇杷夏梅。
科　名：薔薇科(Rosaceae)
學　名：*Eriotrya deflexa* (Hemsl.) Nakai
生育特徵：多年生常綠喬木，單葉互生，長橢圓形。圓錐花序，頂生，開白花，果為仁果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果。
主要成分：生物鹼。
功　效：木材製用具。果可生食，止咳、消炎用。
產　地：台灣、恆春。

編　號：787

高士佛赤楠

科　名：桃金孃科(Myrtaceae)
學　名：*Syzygrim kusukusense* (Hayata) Mori
生育特徵：多年生常綠小喬木，葉對生，長橢圓形、倒披針狀長橢圓形。花呈短聚繖花序，頂生，果為漿果，熟時暗紫色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、木材。
主要成分：含生物鹼。
功　效：為消炎、止渴、醒腦之效。
產　地：台灣、恆春、蘭嶼、新竹。

編　號：788

大葉楠

別　名：楠仔
科　名：樟科 (Lauraceae)
學　名：*Machilus kusanoi* Hayata
生育特徵：多年生常綠喬木，嫩芽淡紅色，葉互生，或近對生，葉呈倒披針形、長橢圓狀披針形。花為聚繖狀圓錐花序，腋生，結漿果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、木材。
主要成分：生物鹼。
功　效：為消炎、止渴、醒腦之效。
產　地：台灣、新竹。

土楠

編　　號：789
科　　名：樟科 (Lauraceae)
學　　名：*Cryptocarya concinna* Hance
生育特徵：多年生中喬木，葉互生，闊橢圓形。圓錐花序，果為核果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、木材、葉。
主要成分：含揮發油、生物鹼。
功　　效：為止痛、提神之效。
產　　地：台灣、新竹。

台灣赤楠

編　　號：790
別　　名：大號犁頭樹、赤蘭番仔掃箒
科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)
學　　名：*Syzygium formosnum* (Hayata) Moi
生育特徵：多年生常綠喬木，葉對生，呈長橢圓形、倒卵形。花呈圓錐狀聚繖花序，頂生，白色，果為漿果，熟時紫黑色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、木材。
主要成分：含揮發油、生物鹼。
功　　效：為清涼、消炎止痛之效。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：791

小芽新木薑子

別　　名：芽新木薑子
科　　名：樟科(Lauraceae)
學　　名：*Neolitsea parvigemma* (Hayata) Kanehira & Sasaki
生育特徵：多年生常綠小喬木，葉互生，呈長橢圓形、卵狀長橢圓形。單性花，為繖形花序，果為漿果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、木材。
主要成分：含揮發油、生物鹼。
功　　效：為消炎止痛之用。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：792

菲律賓胡頹子

別　　名：大葉胡頹子
蘭嶼胡頹子
科　　名：胡頹子科(Elaeagnaceae)
學　　名：*Elaeagnus triflora* Roxb
生育特徵：多年生常綠灌木，葉互生，闊卵形、橢圓形。葉背銀白色。花單生，腋出，結核果，熟時紅色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、根、葉。
主要成分：含生物鹼。
功　　效：果可食，止痢。根葉治瘡疥、氣喘咳。
產　　地：台灣、新竹、菲律賓。

編　號：793

刺杜蜜

別　名：刺楠

科　名：大戟科 (Euphorbiaceae)

學　名：*Bridelia balansae* Tutch

生育特徵：多年生常綠小喬木，葉互生，披針狀長橢圓形、倒卵形。單性花，黃綠色，果為核果，熟時黑色或紅黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果、根、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：為消炎、鎮痙、止痛之效。

產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：794

裏白饅頭果

別　名：饅頭果、文頭果細葉饅頭果。

科　名：大戟科 (Euphorbiaceae)

學　名：*Glochidion acuminatum* Muell.-Arg

生育特徵：多年生小喬木，葉互生，披針狀長橢圓形、長橢圓形。單性花，腋生，果為蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果、根莖、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　效：為消炎、消腫、止痛等之效。

產　地：中國、印度、日本、台灣、新竹。

編　號：795

台灣狄氏厚殼

別　名：破布烏、布布烏
布布烏樹、破布烏樹

科　名：紫草科 (Boraginaceae)

學　名：*Ehretia dicksonii* Hance

生育特徵：多年生落葉喬木，葉互生，闊橢圓形。花為聚繖花序，頂生，開白花，果核果。熟時黃色、紅色或黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果、根、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　效：為瘀風、行血、治腳酸麻等。

產　地：中國、日本、台灣、新竹。

編　號：796

薄姜木

別　名：布荊、山紫荊
烏甜仔、烏甜。

科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　名：*Vitex guinata*(Lour.) F.N. Williams

生育特徵：多年生小喬木，掌狀複葉，小葉倒卵狀橢圓形、橢圓形。圓錐花序，頂生，花黃白色，果核果，熟時黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉、心材。

主要成分：生物鹼。

功　效：根、心材有清熱、鎮靜、止咳、定喘之效。葉有袪風、清肺、止咳、行血、活血、止血。

產　地：中國、印度、菲律賓、台灣、新竹。

紫杉

編　　號：797

別　　名：台灣紅豆杉、紅豆杉紅杉。

科　　名：紅豆杉科 (Taxaceae)

學　　名：*Taxus mairei* (Lemee & Levl.) Hu ex Liu

生育特徵：多年生常綠大喬木，葉互生，呈線狀披針形。單性花，頂生，腋生，種子橢圓形，稍扁，赤紅色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：含紫杉醇。

功　　效：可治癌症。

產　　地：中國、菲律賓、台灣、新竹

可可

編　　號：798

別　　名：可可樹、可可亞樹可加樹、巧克力樹巧古立加樹

科　　名：梧桐科 (Sterculiaceae)

學　　名：*Theobroma cacao* Linn

生育特徵：多年生常綠灌木狀小喬木，葉互生，長倒卵形、長橢圓形。花簇生主幹或老枝上。粉紅色，果實橢圓形、長橢圓形，熟時桔黃色至桔紅色，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉、種仁。

主要成分：種子含脂肪油、蛋白質、可可鹼、咖啡鹼、可可豆油。

功　　效：有滋養、強壯、強心利尿之效。可治水腫。

產　　地：中南美洲、西印度、台灣、新竹

編　號：799

蟠桃

別　名：壽桃
科　名：薔薇科(Rosaceae)
學　名：*Prunus persica*
生育特徵：多年生落葉喬木，葉互生，橢圓形、長橢圓形或披針形。花單一，白色帶淺紫色，果為核果，熟時紅紫色，呈扁形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、仁。
主要成分：生物鹼。
功　效：果鮮食，清涼、退火，益壽延年。核仁亦即桃仁可消炎。
產　地：中國、台灣、新竹

編　號：800

十字蒲瓜樹

別　名：蒲瓜樹、瓠瓜木炮彈果。
科　名：紫葳科 (Bignoniaceae)
學　名：*Crescentia cujete* Linn
生育特徵：多年生落葉喬木，葉叢生枝節上密集或樹幹短枝上，葉片倒卵狀廣披針形至披針形。葉片大小變化大，其葉片似十字形，上下葉片大，中間支左右葉片小，花單生，暗黃色至暗紫紅色，果蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。
利用部位：樹皮、果皮、果、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：樹皮有解熱、收歛之效。葉有清熱、收斂、止血之效。果有化痰、止咳。果皮退熱之效。
產　地：美洲、西印度、台灣、新竹。

二、參考文獻

1.謝阿才、楊再義。1696。台灣植物名彙。國立台灣大學農學院。台北。
2.甘偉松。1980。台灣藥用植物誌第 1-3 卷。國立中國醫藥研究所。台北。
3.甘偉松。1981。藥用植物學。國立中國醫藥研究所。台北。
4.甘偉松。1968。台灣植物藥材誌第 1-3 輯。中國醫藥出版社。台北。
5.邱年永、張光雄。1983。原色台灣藥用植物圖鑑 1-6。南天書局。台北。
6.楊文乾。1997。神奇草藥大圖鑑 1-3。林鬱文化事業有限公司出版。台北。
7.萊斯莉、布倫尼斯。1994。藥用植物圖鑑。貓頭鷹出版。台北。
8.戶苅義次。1963。藥草栽培。養賢堂發行。台北。
9.好兄弟編輯部。1987。常見中草藥第 1-7 輯。好兄弟出版社。台北。
10.鍾錠全。2002。青草世界彩色圖鑑。永光彩色印刷股份有限公司。台北。
11.高木村。2002。台灣民間藥第 1-3 輯。南天書局。台北。
12.邱年永。1997。高山藥用植物。南天書局。台北。
13.顏焜熒。1999。原色常用中藥圖鑑。南天書局。台北。
14.許喬木、邱年永。1997。原色野生食用植物圖鑑。南天書局。台北。
15.蕭培根、連文琰。1998。原色中藥原植物圖鑑（上、下）。南天書局。台北。
16.賴榮祥。1976。原色生藥學。創譯出版社。台北。
17.邱年永。1991。百草茶原植物。弘祥出版社。台中。
18.張定霖、吳昭祥、洪進雄。2003。香藥草植物圖鑑。行政院農業委員會種苗改良繁殖場。台中。
19.徐順裕。2004。救人青草藥。元氣齋出版社。台北。
20.楊遠波、劉和義。2002。台灣維管束植物簡誌第 1-6 卷。行政院農業委員會出版。台北。
21.鄭武燦。2000。台灣植物圖鑑（上、下）。國立編譯館。台北。
22.徐國鈞。1991。常用中草藥彩色譜。福建科學技術出版。福建。
23.吳進錩。1979。天然彩色台灣藥草第一輯。南林書局。台北。
24.吳進錩。1980。天然彩色台灣藥草第二輯。南林書局。台北。
25.吳進錩。1980。天然彩色台灣藥草第三輯。南林書局。台北。
26.邱年永。1973。藥用植物栽培法。大學圖書公司。台北。
27.徐氏基金會。1980。最新藥用植物栽培法。徐氏基金會。台北。
28.高木村。1981。台灣藥用植物手冊。南天書局。台北。
29.許鴻源。1985。簡明藥材學。新醫藥出版社。台北。

30.許鴻源。1975。藥用植物分類學。新醫學出版社。台北。

31.戴新民。1984。中藥栽培法。啓業書局。台北。

32.豐年社附設出版部。1988。經濟植物集。豐年社。台北。

33.豐年社附設出版部。1987。青草集。豐年社。台北。

34.張鴻銘。1980。中藥大辭典第 1-5 冊。昭人出版社。台中。

35.中國生草藥研究發展中心。1978。常用中草藥彩色圖譜。宏業書局。台北。

36.廖隆德。2001。蘭嶼藥用植物資源之調查研究稿（未發表）。中國醫藥學院中國藥學研究所。

37.徐火周、王從義、陳耀雄。1999。中藥材識別應用。廣東科技出版社。廣州。

38.宋立人、洪恂、丁緒亮、臧載陽。2000。現代中藥學大辭典（上、下）。人民衛生出版社。北京。